

青海省果洛州鸟类分布情况调查报告

● 背景


2005年8月9—20日，深圳市观鸟协会董江天、张高峰与青海果洛州久治县白玉寺喇嘛居·扎西桑俄（以下简称扎西）在久治县白玉乡及班玛县班玛林场进行鸟类观察。但由于在林场内遇到塌方，当年预期的班玛林场调查只覆盖了约一半区域。2006年，白玉寺得到香港观鸟会中国自然保育基金资助，在果洛州白玉寺辖区内开展鸟类调查活动。本项目由扎西负责根据需要开展日常调查。2006年2月17日，经扎西向白玉寺申请，白玉寺将后山划为鸟类保护小区。同年5月15—30日，董江天、扎西及朱伽（白玉寺喇嘛）一起，再次以白玉乡及班玛林场为主要区域，进行调查。

● 调查报告

久治县是青海省东南部果洛州辖县，总面积8757平方公里，人口大约17,000人，藏族为主约占总人口的99%，是纯牧业县。久治县属高原湿润性高寒气候，巴颜喀拉山脉的年保山贯穿全县，山脉以北为宽谷和山间盆地，属黄河水系；山脉以南为南北向的峡谷，属长江水系。珍贵的药用植物有冬虫草、川贝、雪莲、佛手参、大黄等；珍贵的野生动物和禽类有熊、旱獭、雪豹、雪鸡和黑颈鹤等。

扎西的鸟类观察记录均以藏文记载，使用的也是当地民间的鸟类名称。董江天与扎西在果洛调查期间采取对照扎西手绘作品、实地观察、分析野外辨认特征、描述生活习性及对照《中国鸟类野外手册》鸟类名称等方式，逐一核对记录（详见附表）。自2005年8月至2006年5月，共记录鸟种136种（包含11目30科81属），其中‘Birds to Watch’名录V（易危）1种、NT（接近受危）2种；CITES附录等级1级1种、2级9种；RDB（中国濒危物种红皮书）R（稀有）6种、E（濒危）2种、V（易危）4种；PROT（中国重点保护名录）P（二级）14种、I（一级）6种。

◆调查区域（红旗标示为所到调查地点）：



◆ 2006年特别记录

- # 0079, 赤麻鸭, 历史记录冬天没有出现过, 06年有4只越冬, 为首笔记录
- # 0468, 胡兀鹫, 雌鸟头部羽毛不是黑色, 没有髭须; 2月14日3只幼鸟开始飞行
- # 0494, 大鸮, 3月1日有6只死亡, 死因未明
- # 0710, 棕背黑头鹀, 5月12日小鸟出壳
- # 0882, 家燕, 3月7日及4月16日, 分别有2只 *tyteri* 亚种混于指名亚种 *gutturalis* 中
- # 1175, 角百灵, 3月2日年宝湖边聚集超过100只
- # 1228, 鸬岩鹀, 1月7日在白玉寺后山大量聚集
- # 1257, 高山岭雀, 冬季为优势鸟种, 比麻雀的数量多
- # 1280, 拟大朱雀, 冬季雌、雄分群, 雄鸟少, 大约比例为10:3
- # 1303, 白头鹀, 冬季栖息在寺院屋檐内(曾有当地居民提供信息, 称冬季藏鹀在屋檐内栖息, 有可能是白头鹀, 有待进一步核实)
- # 1304, 藏鹀, 2月27日8只(2005年8月在白玉寺后山记录一雄一雌引领一只亚成鸟, 但2006年5月初同样地点却没有藏鹀的记录)

● 关于鸟类的其他信息

- ◆ 根据《藏历火狗年历书》(西藏自治区藏医院天文历算研究所, 四川民族出版社, 2005年第一版)推算, 大杜鹃应该于2006年5月6日到达(实际观察到的日期为5月13日), 雀鹰5月31日开始筑巢, 喜鹊6月2日开始筑巢。
- ◆ 根据资料记载, 有22种藏药是通过动物找到的, 如藏雪鸡下蛋时乌努龙胆发芽, 此时在蛋上画出裂纹, 藏雪鸡就会去寻找乌努龙胆来进行“治疗”。
- ◆ 黑耳鸢大量过境: 1998年, 约1000-1500只黑耳鸢经过白玉乡, 在白玉寺后山停歇, 明显表露疲态, 但引起当地藏狗的恐慌。白玉寺僧众约200人, 每50人一组, 每组轮值4小时, 以免鸟只为狗所伤害。黑耳鸢大部分为迁徙过境鸟, 但也有少量在斑玛林场营巢, 斑玛林场的黑耳鸢于4月30日开始出现筑巢行为。
- ◆ 2006年5月, 一只雀鹰、一只秃鹫死亡。另自2005年10月白玉乡全乡通电后, 居民发现大量红嘴山鸦死于电线杆下, 一般为3-5只死于一根电线杆的附近, 身上羽毛完好, 但脚趾皮有损伤, 怀疑与通电有关。奇怪的是除了红嘴山鸦, 并没有其他停歇在电线上的鸟类出现同样的死亡现象。
- ◆ # 0795, 蓝大翅鸬, 是白玉乡6-10月的鸟季中最后到达的一种鸟类。
- ◆ # 0345, 青脚鹬, 夏季在河边选择与蛋大小相同的石头筑巢

● 红嘴山鸦的故事

红嘴山鸦与果洛州白玉乡居民世代友好相处, 似乎已经成了人民生活中密不可分的一部分。扎西家的屋檐里就有一窝红嘴山鸦安居乐业。扎西家的老房子象传统的藏民定居地平房一样, 也有屋檐, 屋檐里是空的, 常常有鸟类在里面生活。那时候就有一对红嘴山鸦住在老的屋檐里, 每年都会有一窝小红嘴山鸦出世, 一等屋檐里传来唧唧啾啾的叫声, 鸟爸鸟妈便开始忙碌起来, 扎西一家已经习惯了这年复一年的准时报告。这几年, 新建的水泥砖房, 为了不影响鸟儿的生活, 专门保留了进出屋檐的通道, 红嘴山鸦也毫不嫌弃地搬了进来。

因为新房安装了玻璃窗, 红嘴山鸦开始不太适应, 有一只一头撞到窗户上, 不过很快就接受了教训, 其他的鸟儿也没有再发生这样的情况。

厨房就在红嘴山鸦居住的屋檐下, 其实是一间摆放餐具和食物的房间, 没有烟囱, 通常不在这里开火, 还是在客厅里用牛粪烧火的方式更被接受。厨房有一扇窗户, 红嘴山鸦偶尔会在窗户外用嘴啄玻璃窗, 敲几下, 主人就知道, 它是想吃“油”了。因为红嘴山鸦每搁一段时间就需要补充一

点“油水”或在觅食困难的时候向“家人”求助，于是主人就会从自家食用的牛腿上切一小块很肥的牛油扔出去。

红嘴山鸦很恋家，房檐里的家用了一年又一年，每年小鸟学会飞行后，两夫妻就把小孩子轰出去自立门户，对不愿离家的小家伙绝不嘴软。

到底红嘴山鸦能活多少年呢？能否象人类一样很迅速地适应人居环境的变化呢？也许扎西家的这一对能给我们一个惊喜。

● 其他资料

- ◆ 白玉乡总人口约 3 3 0 0 人，其中本地藏民（含本地僧侣）3 0 0 0 人，外地移民者和外地僧人、学生约 3 0 0 人。主要的经济来源是药材（主要销往西宁、广东）、牧业主要为牦牛和马（主要销往成都、西宁，甘肃和宁夏）。其中销往外地的牦牛主要用于食用，本地牦牛则用于生产牛奶、奶酪、酥油、牛毛、牛皮，牛奶和奶酪的经济效益较高。销往外地的马匹主要用于贸易和食用，本地的马匹主要用于放牧和赛马（赛马节由政府根据当年的情况决定具体日期，一般安排在 7 月）。
- ◆ 教育：过去，当地居民的风俗是大约 6 岁开始送子女到寺院学习基础知识，青少年时期开始学习佛教，成年后自由选择还俗或继续称为僧人。某种意义上而言，寺庙就是当地的学校。2 0 0 5 年国家针对青海的教育政策规定，孩童自 7 岁起接受 9 年义务教育，由政府支付学杂费、食宿、校服等全部教育费用。
- ◆ 白玉寺宗教辖区：四川阿坝州（黑水、理县、马尔康、金川、红原）；四川甘孜州（白玉县）；青海果洛州（班玛、久治、甘德、达日、玛多）；青海玉树州（曲麻莱）；青海海南州（同德）；青海海西州（都兰）。
- ◆ 主要药材产品（参考《藏药彩图》北京民族出版社，1995 年第一版）：藏麻，春天解冻后大约可挖的工期为 2 0 天，1 1 月时的可挖工期也为 2 0 天左右；挖虫草的季节为 5 月 1 日至 6 月 1 5 日，这个期间政府规定放假两个月。收采贝母、大黄的时间为 7 - 9 月（大黄目前数量稀少，9 9 年开始政府规定不许采大黄），同时段收获的草药还有宽叶羌活（过渡采挖会导致动物吃不到这种植物后大面积掉毛死去）、甘松（主要销往印度、尼泊尔用于造香及香水）、秦九、独一味（战略药品）。采摘药材占当地居民全年收入的约 8 0 % 有多。
- ◆ 鼠害：8 0 年代开始青海大面积灭鼠（高原鼠），同时也毒死了大量的鹭、狐狸、牛、马等，8 1 - 8 2 年最为严重，当时引起媒体关注。0 6 年是其他动物受害较轻的一年。
- ◆ 瞎老鼠（当地的叫法）：一种视力退化的鼠类，比高原鼠体型大许多。懂得夏季挖草根储备起来过冬。地洞在地下约 2 米（地下约 1 米地冻），仓库较浅距离居住的地洞约 3 - 4 米，在地面敲打时能够察觉其仓库的所在。藏民常根据其喜爱收藏品寻找草药的所在。
- ◆ 外来资助：1 9 9 8 - 9 9 年，一位加拿大籍女士向果洛州政府部门捐助 2 万元人民币，用于恢复名贵藏药大黄的保护。主要目标是请当地居民约 1 5 人在白玉乡白玉寺后山人工种植大黄，并借助寺院管理使其免于挖采。但是，由于这笔资金最后没有按照原订计划落实到位，大黄的种植没有继续进行，只在白玉寺后山有零星的大黄处于寺院的保护中。白玉寺自身有一套针对社会捐赠款的管理体系，规定必须严格按照资助方要求专款专用。
- ◆ 川陕哲罗鲑：川陕哲罗鲑为哲罗鲑属 4 种鱼类中，中国特有的一种，属冷水性鱼类，已被列入国家二级保护动物和中国濒危动物红皮书，濒临灭绝。目前仅在果洛州班玛县玛可河流域分布。国家渔业部门于 1 9 9 8 - 2 0 0 4 年进行了四次调查活动，均没有收获活体标本。2 0 0 6 年我们在玛可河进行鸟类调查时，发现研究机构在玛可河保护站建了一座水池，并悬赏 2 万元用于奖励当地居民报告川陕哲罗鲑的发现。当地居民认为此举将对这种鱼类带来毁灭性的打击，没有当地藏民报告相关信息。
- ◆ 豹虎：扎西和朱伽（鸟类调查组成员）于 2 0 0 5 年 4 - 5 月期间，从白玉乡骑自行车到

阿坝，进行为期40天的生境调查。走访期间，当地居民称在斑玛县山林中看到“有豹的斑点和虎的斑纹”集于一身的兽类。但当次自行车调查及05—06年间的两次鸟类调查过程中，都没有目击的记录。

- ◆ 黄河源草场恢复试验（扎西的报告，自费）：2004年10月，以50元购买玛多县当地产的草籽，种植了约60平方米；2005年7月，再次到玉树州黄河源头种植60平方米；2005年9月选择白玉乡产的4种草籽在扎曲格萨尔王寺种植约4000平方米，都长势喜人，可以用于推广。
- ◆ 藏族传统矿物颜料制造：藏传宗教系统内过去沿用矿物颜料，可历千年不变色。但由于制作工序艰难且用于寺院，制作者难有经济效益，已经接近失传。目前寺院较多使用丙烯颜料。

附表：调查记录总表

A：2005年8月9—20日，调查人员为董江天、张高峰、扎西；

B：2006年5月15—30日，调查人员为董江天、扎西、朱伽；

C：根据扎西于2005年8月21日—2006年5月14日期间（除A/B时段），进行日常记录总结的备注。

| 序号 | 手册 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 学名 | B2W | CITES | RDB | PROT | A | B | C |
|----|----------|--------|---------------------------|---------------------------------|-----|-------|-----|------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 藏雪鸡 | Tibetan Snowcock | <i>Tetraogallus tibetanus</i> | | | | P | * | | |
| 2 | 12 | 高原山鹑 | Tibetan Partridge | <i>Perdix hodgsoniae</i> | | | | | * | * | |
| 3 | 28 | 血雉 | Blood Pheasant | <i>Ithaginis cruentus</i> | | | V | P | | * | |
| 4 | 63 | 斑尾榛鸡 | Chinese Grouse | <i>Tetrastes sewerzowi</i> | NT | | | I | | * | |
| 5 | 79 | 赤麻鸭 | Ruddy Shelduck | <i>Tadorna ferruginea</i> | | | | | * | * | 夏候鸟，2006年2月首次有4只越冬记录 |
| 6 | 92 | 琵嘴鸭 | Northern Shoveler | <i>Anas clypeata</i> | | | | | | | 过境鸟，偶见 |
| 7 | 114 | 普通秋沙鸭 | Common Merganser | <i>Mergus merganser</i> | | | | | * | * | |
| 8 | 127 | 棕腹啄木鸟 | Rufous-bellied Woodpecker | <i>Dendrocopos hyperythrus</i> | | | | | | * | |
| 9 | 143 | 灰头绿啄木鸟 | Grey-headed Woodpecker | <i>Picus canus</i> | | | | | | * | |
| 10 | 163 | 戴胜 | Common Hoopoe | <i>Upupa epops</i> | | | | | * | * | |
| 11 | 193 | 大杜鹃 | Eurasian Cuckoo | <i>Cuculus canorus</i> | | | | | * | * | 夏候鸟，06年5月13日为当年首次记录 |
| 12 | 220 | 普通楼燕 | Common Swift | <i>Apus apus</i> | | | | | | * | 夏候鸟 |
| 13 | 221 | 白腰雨燕 | Fork-tailed Swift | <i>Apus pacificus</i> | | | | | * | * | 夏候鸟 |
| 14 | 233 | 雕鸮 | Eurasian Eagle Owl | <i>Bubo bubo</i> | | 2 | R | P | * | * | |
| 15 | 247 | 领鸺鹠 | Collared Owlet | <i>Glaucidium brodiei</i> | | | | P | | * | |
| 16 | 249 | 纵纹腹小鸮 | Little Owl | <i>Athene noctua</i> | | | | P | * | * | 留鸟，有繁殖记录 |
| 17 | 264 | 岩鸽 | Hill Pigeon | <i>Columba rupestris</i> | | | | | * | * | |
| 18 | 269 | 点斑林鸽 | Speckled Wood Pigeon | <i>Columba hodgsonii</i> | | | | | | * | |
| 19 | 274 | 山斑鸠 | Oriental Turtle Dove | <i>Streptopelia orientalis</i> | | | | | | * | |
| 20 | 304 | 黑颈鹤 | Black-necked Crane | <i>Grus nigricollis</i> | V | 1 | E | I | * | | 2005年8月记录一只成鸟引领一只幼鸟 |
| 21 | 334 | 扇尾沙锥 | Common Snipe | <i>Gallinago gallinago</i> | | | | | | | 夏季偶见 |
| 22 | 348 | 白腰草鹞 | Green Sandpiper | <i>Tringa ochropus</i> | | | | | | | 夏季偶见 |
| 23 | 349 | 林鹞 | Wood Sandpiper | <i>Tringa glareola</i> | | | | | | | 过境鸟，偶见 |
| 24 | 351 | 矶鹞 | Common Sandpiper | <i>Actitis hypoleucos</i> | | | | | * | | |
| 25 | 385 | 鸮嘴鹞 | Ibisbill | <i>Ibidorhyncha struthersii</i> | | | | | * | * | |
| 26 | 392 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover | <i>Charadrius dubius</i> | | | | | | | 夏季偶见 |
| 27 | 400 | 凤头麦鸡 | Northern Lapwing | <i>Vanellus vanellus</i> | | | | | | | 过境鸟，偶见 |
| 28 | 422 | 渔鸥 | Pallas's Gull | <i>Larus ichthyæetus</i> | | | | | | | 过境鸟，4月及11月各停留约20天，连续17 |

| | | | | | | | | | | | 年记录 |
|----|-----|-------|-----------------------|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 29 | 423 | 棕头鸥 | Brown-headed Gull | <i>Larus brunnicephalus</i> | | | | | * | | |
| 30 | 440 | 普通燕鸥 | Common Tern | <i>Sterna hirundo</i> | | | | | * | * | |
| 31 | 461 | 黑耳鸢 | Black-eared Kite | <i>Milvus lineatus</i> | | | | P | * | * | 过境及夏候鸟，有繁殖记录，自1998年开始于4月有1000—1500只过境 |
| 32 | 468 | 胡兀鹫 | Lammergeier | <i>Gypaetus barbatus</i> | | 2 | V | I | * | * | 留鸟，2006年2月14日3只幼鸟开始飞行，雌鸟头黑色没有髭须 |
| 33 | 470 | 高山兀鹫 | Himalayan Griffon | <i>Gyps himalayensis</i> | | 2 | R | P | * | * | 有繁殖记录 |
| 34 | 472 | 秃鹫 | Cinereous Vulture | <i>Aegypius monachus</i> | NT | 2 | V | P | * | * | |
| 35 | 487 | 雀鹰 | Eurasian Sparrowhawk | <i>Accipiter nisus</i> | | | | P | * | * | 2006年5月16日一只死亡 |
| 36 | 494 | 大鵟 | Upland Buzzard | <i>Buteo hemilasius</i> | | | | P | * | * | 2006年5月拾获4只幼鸟 |
| 37 | 496 | 林雕 | Black Eagle | <i>Ictinaetus malayensis</i> | | 2 | R | P | * | * | |
| 38 | 500 | 金雕 | Golden Eagle | <i>Aquila chrysaetos</i> | | 2 | V | I | * | * | 留鸟，有繁殖记录 |
| 39 | 508 | 红隼 | Common Kestrel | <i>Falco tinnunculus</i> | | | | P | * | * | |
| 40 | 512 | 燕隼 | Eurasian Hobby | <i>Falco subbuteo</i> | | | | P | * | * | |
| 41 | 514 | 猎隼 | Saker Falcon | <i>Falco cherrug</i> | | 2 | R | I | * | * | 2006年5月记录幼鸟三只 |
| 42 | 516 | 游隼 | Peregrine Falcon | <i>Falco peregrinus</i> | | 2 | R | P | * | * | |
| 43 | 545 | 池鹭 | Chinese Pond Heron | <i>Ardeola bacchus</i> | | | | | * | * | |
| 44 | 568 | 黑鹳 | Black Stork | <i>Ciconia nigra</i> | | 2 | E | I | | | 冬候鸟，数量稀少 |
| 45 | 616 | 棕背伯劳 | Long-tailed Shrike | <i>Lanius schach</i> | | | | | * | * | |
| 46 | 617 | 灰背伯劳 | Grey-backed Shrike | <i>Lanius tephronotus</i> | | | | | * | * | 留鸟，有繁殖记录 |
| 47 | 630 | 灰喜鹊 | Azure-winged Magpie | <i>Cyanopica cyanus</i> | | | | | * | * | |
| 48 | 636 | 喜鹊 | Black-billed Magpie | <i>Pica pica</i> | | | | | * | * | |
| 49 | 639 | 褐背拟地鸦 | Hume's Groundpecker | <i>Pseudopodoces humilis</i> | | | | | * | * | 有繁殖记录 |
| 50 | 641 | 红嘴山鸦 | Red-billed Chough | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | | | | | * | * | 有繁殖记录 |
| 51 | 644 | 达乌里寒鸦 | Daurian Jackdaw | <i>Corvus dauuricus</i> | | | | | * | * | |
| 52 | 647 | 小嘴乌鸦 | Carrion Crow | <i>Corvus corone</i> | | | | | * | * | |
| 53 | 648 | 大嘴乌鸦 | Large-billed Crow | <i>Corvus macrorhynchos</i> | | | | | * | * | |
| 54 | 651 | 渡鸦 | Common Raven | <i>Corvus corax</i> | | | | | * | * | |
| 55 | 666 | 短嘴山椒鸟 | Short-billed Minivet | <i>Pericrocotus brevirostris</i> | | | | | * | * | 夏候鸟 |
| 56 | 672 | 黑卷尾 | Black Drongo | <i>Dicrurus macrocercus</i> | | | | | * | * | |
| 57 | 687 | 河乌 | White-throated Dipper | <i>Cinclus cinclus</i> | | | | | * | * | |
| 58 | 688 | 褐河乌 | Brown Dipper | <i>Cinclus pallasii</i> | | | | | * | * | 有繁殖记录 |
| 59 | 693 | 蓝矶鹑 | Blue Rock Thrush | <i>Monticola solitarius</i> | | | | | * | * | |

| | | | Warbler | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------|
| 91 | 975 | 褐柳莺 | Dusky Warbler | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | | | | | | | * | * | |
| 92 | 977 | 黄腹柳莺 | Tickell's Leaf Warbler | <i>Phylloscopus affinis</i> | | | | | | | * | * | |
| 93 | 982 | 橙斑翅柳莺 | Buff-barred Warbler | <i>Phylloscopus pulcher</i> | | | | | | | * | * | |
| 94 | 987 | 四川柳莺 | Chinese Leaf Warbler | <i>Phylloscopus sichuanensis</i> | | | | | | | | * | |
| 95 | 990 | 极北柳莺 | Arctic Warbler | <i>Phylloscopus borealis</i> | | | | | | | | * | |
| 96 | 991 | 暗绿柳莺 | Greenish Warbler | <i>Phylloscopus trochiloides</i> | | | | | | | | * | |
| 97 | 994 | 乌嘴柳莺 | Large-billed Leaf Warbler | <i>Phylloscopus magnirostris</i> | | | | | | | | * | |
| 98 | 997 | 冠纹柳莺 | Blyth's Leaf Warbler | <i>Phylloscopus reguloides</i> | | | | | | | | * | |
| 99 | 1031 | 大噪鹛 | Giant Laughingthrush | <i>Garrulax maximus</i> | | | | | | | * | * | |
| 100 | 1032 | 眼纹噪鹛 | Spotted Laughingthrush | <i>Garrulax ocellatus</i> | | | | | | | | * | |
| 101 | 1041 | 橙翅噪鹛 | Elliot's Laughingthrush | <i>Garrulax elliotii</i> | | | | | | | * | * | |
| 102 | 1174 | 小云雀 | Oriental Skylark | <i>Alauda gulgula</i> | | | | | | | * | * | |
| 103 | 1175 | 角百灵 | Horned Lark | <i>Eremophila alpestris</i> | | | | | | | * | * | |
| 104 | 1195 | 家麻雀 | House Sparrow | <i>Passer domesticus</i> | | | | | | | * | * | 2006年5月首次记录约60只 |
| 105 | 1197 | 山麻雀 | Russet Sparrow | <i>Passer rutilans</i> | | | | | | | | * | |
| 106 | 1198 | [树]麻雀 | Eurasian Tree Sparrow | <i>Passer montanus</i> | | | | | | | * | * | |
| 107 | 1201 | 褐翅雪雀 | Tibetan Snowfinch | <i>Montifringilla adamsi</i> | | | | | | | * | * | |
| 108 | 1202 | 白腰雪雀 | White-rumped Snowfinch | <i>Pyrgilauda taczanowskii</i> | | | | | | | * | * | |
| 109 | 1204 | 棕颈雪雀 | Rufous-necked Snowfinch | <i>Pyrgilauda ruficollis</i> | | | | | | | * | * | 留鸟, 有繁殖记录 |
| 110 | 1206 | 山鹊鸂 | Forest Wagtail | <i>Dendronanthus indicus</i> | | | | | | | | * | |
| 111 | 1207 | 白鹊鸂 | White Wagtail | <i>Motacilla alba</i> | | | | | | | * | * | 夏候鸟, 有繁殖记录 |
| 112 | 1210 | 黄头鹊鸂 | Citrine Wagtail | <i>Motacilla citreola</i> | | | | | | | | * | 夏候鸟 |
| 113 | 1211 | 黄鹊鸂 | Yellow Wagtail | <i>Motacilla flava</i> | | | | | | | | * | |
| 114 | 1222 | 粉红胸鹀 | Rosy Pipit | <i>Anthus roseatus</i> | | | | | | | | * | |
| 115 | 1228 | 鸫岩鹀 | Robin Accentor | <i>Prunella rubeculoides</i> | | | | | | | * | * | 留鸟, 有繁殖记录 |
| 116 | 1229 | 棕胸岩鹀 | Rufous-breasted Accentor | <i>Prunella strophciata</i> | | | | | | | | * | |
| 117 | 1231 | 褐岩鹀 | Brown Accentor | <i>Prunella fulvescens</i> | | | | | | | * | * | |
| 118 | 1234 | 栗背岩鹀 | Maroon-backed Accentor | <i>Prunella immaculata</i> | | | | | | | | * | |
| 119 | 1246 | 金翅雀 | Grey-capped Greenfinch | <i>Carduelis sinica</i> | | | | | | | | | 冬候鸟 |
| 120 | 1254 | 黄嘴朱顶雀 | Twite | <i>Carduelis flavirostris</i> | | | | | | | * | * | |
| 121 | 1256 | 林岭雀 | Plain Mountain Finch | <i>Leucosticte nemoricola</i> | | | | | | | | | 夏季偶见 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|-------------------------|---------------------------------|----|--|--|---|--|--|---|--------------------|------------------------|
| 122 | 1257 | 高山岭雀 | Brandt's Mountain Finch | <i>Leucosticte brandti</i> | | | | | | | | 留鸟，冬季为本地优势鸟种，多于树麻雀 | |
| 123 | 1264 | 长尾雀 | Long-tailed Rosefinch | <i>Uragus sibiricus</i> | | | | | | | * | | |
| 124 | 1267 | 普通朱雀 | Common Rosefinch | <i>Carpodacus erythrinus</i> | | | | | | | * | * | |
| 125 | 1269 | 曙红朱雀 | Pink-rumped Rosefinch | <i>Carpodacus eos</i> | | | | | | | | * | |
| 126 | 1277 | 白眉朱雀 | White-browed Rosefinch | <i>Carpodacus thura</i> | | | | | | | | * | |
| 127 | 1279 | 拟大朱雀 | Streaked Rosefinch | <i>Carpodacus rubicilloides</i> | | | | | | | * | * | 留鸟，冬季雌雄分群，雌雄比例约为 10: 3 |
| 128 | 1290 | 灰头灰雀 | Grey-headed Bullfinch | <i>Pyrrhula erythaca</i> | | | | | | | | * | |
| 129 | 1293 | 黑尾蜡嘴雀 | Yellow-billed Grosbeak | <i>Eophona migratoria</i> | | | | | | | | | 冬候鸟 |
| 130 | 1297 | 白斑翅拟蜡嘴雀 | White-winged Grosbeak | <i>Mycerobas carripes</i> | | | | | | | * | * | |
| 131 | 1299 | 朱鹀 | Pink-tailed Bunting | <i>Urocynchramus pylzowi</i> | | | | | | | | * | |
| 132 | 1303 | 白头鹀 | Pine Bunting | <i>Emberiza leucocephalos</i> | | | | | | | | * | 2—4 月、8 月常见，有繁殖记录 |
| 133 | 1304 | 藏鹀 | Tibetan Bunting | <i>Emberiza koslowi</i> | NT | | | R | | | | * | 2—4 月、8 月常见，有繁殖记录 |
| 134 | 1306 | 戈氏岩鹀 | Godlewski's Bunting | <i>Emberiza godlewskii</i> | | | | | | | * | * | |
| 135 | 1313 | 小鹀 | Little Bunting | <i>Emberiza pusilla</i> | | | | | | | | | 冬候鸟 |
| 136 | 1322 | 灰头鹀 | Black-faced Bunting | <i>Emberiza spodocephala</i> | | | | | | | | * | |

B2W : <Birds to Watch> 名录，V=易危，E=濒危，C=极危，NT=接近受危。

CITES: 数字所指为附录等级。

RDB: 《中国濒危物种红皮书》，R=稀有，E=濒危，V=易危。

PROT: 《中国重点保护名录》，P=列入二级保护，I=列入一级保护。