

■ 附录1 可能符合重点鸟区规格但缺乏资料的地点

下面的是在2006–2007年征询意见期间，由各地的鸟类学者、观鸟组织等建议，基本上符合重点鸟区资格，但因为没有详细资料 and 地点所在。在收集资料之后，它们很可能会列入重点鸟区的名录里面：

◎辽宁省：

1. 绥中王宝乡猛禽迁徙地（Raptor migration passage at Wangbao Xiang）：缺乏猛禽迁徙数量资料及地区面积。

◎四川省：

1. 桐林 （Tonglin）:绿尾虹雉（易危）、黑头噪鸦（易危）、特有鸟区：138川西山区。

2. 德差（Decha）：绿尾虹雉（易危）、特有鸟区：138川西山区。

◎云南省：

1. 白马河林场（Baimahe Forest Farm）：巨鸢（易危）、特有鸟区：139云南山区。

2. 五台山自然保护区（Wutaishan Nature Reserve）：巨鸢（易危）、特有鸟区：139云南山区。

3. 宁洱松山自然保护区（Ning’er Songshan Nature Reserve）：巨鸢（易危）。

4. 昌宁澜沧江自然保护区（Changning Lancang Jiang Nature Reserve）：绿孔雀（易危）。

◎贵州省：

1. 赫章水塘林场、平山林场（Hezhang Shuitang and Pingshan Forest Farms）:白冠长尾雉（易危）、特有鸟区：140中国亚热带林区。

◎河北省

1. 石臼坨（“快乐岛”）（Shijiutuo or Happy Island）:与北戴河相若。

2. 岗南水库（Gangna Reservoir）：大鸨、黑鹳（1%以上）。

3. 沧州海岸（Coastal area of Cangzhou）：集群性水鸟。

◎江苏省

1. 南京沿江湿地（Riverine wetlands in Nanjing）:卷羽鹈鹕、东方白鹳、乌雕、白肩雕、白头鹤。

◎福建省

1. 菜屿列岛（Cao Yu Islands）:黄嘴白鹭（繁殖）、也有燕鸥等繁殖。

2. 围头湾（Weitou Wan）:黑嘴鸥（可以记录到500只）、勺嘴鹬（2006年3月纪录3只，5月及10月也有纪录）、黄嘴白鹭。

3. 莆田清化湾（Putian Qinghua Wan）:黑脸琵鹭、卷羽鹈鹕、黑嘴鸥，超过20000只水鸟。发展的压力很大。

4. 福清湾（Fuqing Wan）:黑脸琵鹭

5. 宁德-日屿（Ri Yu Island）:黄嘴白鹭、褐翅燕鸥繁殖。

6. 屏南县鸳鸯猕猴保护区（Pingnan County Mandarin Duck and Macaque Nature Reesrve）:超过1%鸳鸯。

7. 三明均峰山省级保护区（Junfeng Shan Nature Reserve）：黄腹角雉、白眉山鹧鸪、白颈长尾雉。当地人称是候鸟通道（鸕类），很可能超过2万，因为一个村就抓几千。

8. 永安天宝岩保护区（Tianbaoyan Nature Reserve）：黄腹角雉、白颈长尾雉。

9. 武夷梁野山国家级保护区（Liangyeshan Nature Reserve）：黄腹角雉、白眉山鹧鸪、白颈长尾雉。

10. 永泰青云山国家级自然保护区（Qingyunshan Nature Reserve）：黄腹角雉、白眉山鹧鸪、白颈长尾雉。

11. 灵石山国家森林公园（Lingshishan Forest Park）:黄腹角雉、白眉山鹧鸪、白颈长尾雉，1937年记录过海南鹅。

◎广东省

1. 吴川兰石稻田区（Wuchuan Lanshi Paddies）：黄胸鸥的迁徙要道。

■ 附录2 在中国大陆出现的全球受胁鸟类名录（2006年）

注：CR – 国际性极危 EN – 国际性濒危 VU – 国际性易危

拉丁文名	中文名	英文名	2006年等级
<i>Phoebastria albatrus</i>	短尾信天翁	Short-tailed Albatross	VU
<i>Phoebastria nigripes</i>	黑脚信天翁	Black-footed Albatross	EN
<i>Pelecanus crispus</i>	卷羽鹈鹕	Dalmatian Pelican	VU
<i>Pelecanus philippensis</i>	斑嘴鹈鹕	Spot-billed Pelican	VU
<i>Fregata andrewsi</i>	白腹军舰鸟	Christmas Island Frigatebird	CR
<i>Egretta eulophotes</i>	黄嘴白鹭	Chinese Egret	VU
<i>Gorsachius magnificus</i>	海南鵞	White-eared Night-heron	EN
<i>Gorsachius goisagi</i>	栗鵞	Japanese Night-heron	EN
<i>Ciconia boyciana</i>	东方白鹳	Oriental Stork	EN
<i>Leptoptilos javanicus</i>	秃鹳	Lesser Adjutant	VU
<i>Pseudibis davisoni</i>	黑鹳	White-shouldered Ibis	CR
<i>Nipponia nippon</i>	朱鹳	Crested Ibis	EN
<i>Platalea minor</i>	黑脸琵鹭	Black-faced Spoonbill	EN
<i>Oxyura leucocephala</i>	白头硬尾鸭	White-headed Duck	EN
<i>Anser cygnoides</i>	鸿雁	Swan Goose	EN
<i>Anser erythropus</i>	小白额雁	Lesser White-fronted Goose	VU
<i>Anas formosa</i>	花脸鸭	Baikal Teal	VU
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	云石斑鸭	Marbled Teal	VU
<i>Aythya baeri</i>	青头潜鸭	Baer's Pochard	VU
<i>Mergus squamatus</i>	中华秋沙鸭	Scaly-sided Merganser	EN
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	玉带海雕	Pallas's Fish-eagle	VU
<i>Haliaeetus pelagicus</i>	虎头海雕	Steller's Sea-eagle	VU
<i>Gyps bengalensis</i>	白背兀鹫	White-rumped Vulture	CR
<i>Aquila clanga</i>	乌雕	Greater Spotted Eagle	VU
<i>Aquila heliaca</i>	白肩雕	Imperial Eagle	VU
<i>Falco naumanni</i>	黄爪隼	Lesser Kestrel	VU
<i>Falco cherrug</i>	猎隼	Saker Falcon	EN
<i>Arborophila mandellii</i>	红胸山鹧鸪	Chestnut-breasted Partridge	VU
<i>Arborophila rufipectus</i>	四川山鹧鸪	Sichuan Partridge	EN
<i>Arborophila gingica</i>	白眉山鹧鸪	White-necklaced Partridge	VU
<i>Arborophila ardens</i>	海南山鹧鸪	Hainan Partridge	VU
<i>Tragopan blythii</i>	灰腹角雉	Blyth's Tragopan	VU
<i>Tragopan caboti</i>	黄腹角雉	Cabot's Tragopan	VU
<i>Lophophorus sclateri</i>	白尾梢虹雉	Slater's Monal	VU
<i>Lophophorus lhuysii</i>	绿尾虹雉	Chinese Monal	VU
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	褐马鸡	Brown Eared-pheasant	VU
<i>Syrmaticus ellioti</i>	白颈长尾雉	Elliot's Pheasant	VU
<i>Syrmaticus reevesii</i>	白冠长尾雉	Reeves's Pheasant	VU
<i>Pavo muticus</i>	绿孔雀	Green Peafowl	VU
<i>Grus leucogeranus</i>	白鹤	Siberian Crane	CR
<i>Grus antigone</i>	赤颈鹤	Sarus Crane	VU
<i>Grus vipio</i>	白枕鹤	White-naped Crane	VU
<i>Grus monacha</i>	白头鹤	Hooded Crane	VU
<i>Grus nigricollis</i>	黑颈鹤	Black-necked Crane	VU
<i>Grus japonensis</i>	丹顶鹤	Red-crowned Crane	EN
<i>Coturnicops exquisitus</i>	花田鸡	Swinhoe's Rail	VU
<i>Otis tarda</i>	大鸨	Great Bustard	VU
<i>Chlamydotis undulata</i>	波斑鸨	Houbara Bustard	VU
<i>Vanellus gregarius</i>	黄颊麦鸡	Sociable Lapwing	CR

拉丁文名	中文名	英文名	2006年等级
<i>Gallinago nemoricola</i>	林沙雉	Wood Snipe	VU
<i>Tringa guttifer</i>	小青脚鹬	Spotted Greenshank	EN
<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>	勺嘴鹬	Spoon-billed Sandpiper	EN
<i>Larus saundersi</i>	黑嘴鸥	Saunders's Gull	VU
<i>Larus relictus</i>	遗鸥	Relict Gull	VU
<i>Sterna bernsteini</i>	黑嘴端凤头燕鸥	Chinese Crested-tern	CR
<i>Rynchops albicollis</i>	剪嘴鸥	Indian Skimmer	VU
<i>Synthliboramphus wumizusume</i>	冠海雀	Japanese Murrelet	VU
<i>Columba eversmanni</i>	中亚鸽	Pale-backed Pigeon	VU
<i>Columba punicea</i>	紫林鸽	Pale-capped Pigeon	VU
<i>Ketupa blakistoni</i>	毛腿渔鸦	Blakiston's Fish-owl	EN
<i>Aceros nipalensis</i>	棕颈无盔犀鸟	Rufous-necked Hornbill	VU
<i>Pitta nympha</i>	仙八色鸫	Fairy Pitta	VU
<i>Pycnonotus taivanus</i>	台湾鹎	Taiwan Bulbul	VU
<i>Turdus feae</i>	褐头鹟	Grey-sided Thrush	VU
<i>Brachypteryx hyperythra</i>	锈腹短翅鹟	Rusty-bellied Shortwing	VU
<i>Luscinia ruficeps</i>	棕头歌鸫	Rufous-headed Robin	VU
<i>Luscinia obscura</i>	黑喉歌鸫	Black-throated Blue Robin	VU
<i>Saxicola insignis</i>	白喉石鹀	White-throated Bushchat	VU
<i>Garrulax sukatschewi</i>	黑额山噪鹛	Snowy-cheeked Laughingthrush	VU
<i>Garrulax bieti</i>	白点鹛	White-speckled Laughingthrush	VU
<i>Liocichla omeiensis</i>	灰胸薮鹛	Omei Shan Liocichla	VU
<i>Alcippe variegaticeps</i>	金额雀鹛	Gold-fronted Fulvetta	VU
<i>Paradoxornis zappeyi</i>	暗色鴉雀	Grey-hooded Parrotbill	VU
<i>Paradoxornis przewalskii</i>	灰冠鴉雀	Rusty-throated Parrotbill	VU
<i>Locustella pleskei</i>	史氏蝗莺	Styan's Grasshopper-warbler	VU
<i>Acrocephalus sorghophilus</i>	细纹苇莺	Streaked Reed-warbler	VU
<i>Acrocephalus tangorum</i>	远东苇莺	Manchurian Reed-warbler	VU
<i>Phylloscopus ijimae</i>	伊豆柳莺	Izu Leaf-warbler	VU
<i>Phylloscopus hainanus</i>	海南柳莺	Hainan Leaf-warbler	VU
<i>Megalurus pryeri</i>	斑背大尾莺	Marsh Grassbird	VU
<i>Rhinomyias brunneata</i>	白喉林鹟	Brown-chested Jungle-flycatcher	VU
<i>Sitta magna</i>	巨鹇	Giant Nuthatch	VU
<i>Sitta formosa</i>	丽鹇	Beautiful Nuthatch	VU
<i>Certhia tianquanensis</i>	四川旋木雀	Sichuan Treecreeper	VU
<i>Emberiza jankowskii</i>	栗斑腹鹀	Rufous-backed Bunting	VU
<i>Emberiza sulphurata</i>	硫磺鹀	Yellow Bunting	VU
<i>Oriolus mellianus</i>	鵲色鹀	Silver Oriole	VU
<i>Perisoreus internigrans</i>	黑头噪鹛	Sichuan Jay	VU

■ 附录3 中国境内出现的狭布种名录，按其所在的特有鸟区和二等鸟区分列

注：狭布种（Restricted-ranged species）的定义是繁殖总面积据估计在50,000 km²以下的鸟类

依照Stattersfield *et al.* (1998) 对特有鸟区和二等鸟区的定义，本附录提供了关于中国境内所有这两类鸟区的详细资料，包括这些鸟区所在的行政区划，以及其中狭布种的重要生境类型和海拔分布范围，并列出了仅分布于该鸟区中的狭布种种数，以及所有出现在该鸟区中的狭布种种数（受胁狭布种的种数在括号中以粗体标出）。附表中进一步列出了每个特有鸟区和二等鸟区中出现的狭布种名单，其中全球性受胁鸟种（依照国际鸟盟2004年公布的名录）以粗体标出。需要注意的是，第130号特有鸟区，即喜马拉雅东部山区的鸟种名单中，含有一些在中国境内没有记录的鸟种。

第127号特有鸟区 塔克拉玛干沙漠

所在： 中国大陸

重要生境类型：沙漠、灌丛

海拔范围：900–1,300 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (0)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Caprimulgus centralasicus</i>	中亚夜鹰	Vaurie's Nightjar
<i>Podoces biddulphi</i>	白尾地鸨	Xinjiang Ground-jay

第130号特有鸟区 喜马拉雅东部山区

所在： 孟加拉、不丹、中国大陸、印度、缅甸、尼泊尔

重要生境类型：亚热带丘陵地带森林、温带森林、亚高山森林

海拔范围：300–4,000 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—19 (9)；出现于该特有鸟区的所有种类—22 (9)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Arborophila mandellii</i>	红胸山鹧鸪	Chestnut-breasted Partridge
<i>Tragopan blythii</i>	衣腹角雉	Blyth's Tragopan
<i>Lophophorus sclateri</i>	白尾梢虹雉	Sclater's Monal
<i>Apus acuticauda</i>	暗背雨燕	Dark-rumped Swift
<i>Harpactes wardi</i>	红腹咬鹃	Ward's Trogon
<i>Brachypteryx hyperythra</i>	锈腹短翅鹟	Rusty-bellied Shortwing
<i>Garrulax virgatus</i>	纹耳噪鹛	Striped Laughingthrush
<i>Spelaeornis caudatus</i>	短尾鹪鹛	Rufous-throated Wren-babbler
<i>Spelaeornis badeigularis</i>	锈喉鹪鹛	Rusty-throated Wren-babbler
<i>Spelaeornis longicaudatus</i>	茶胸鹪鹛	Tawny-breasted Wren-babbler
<i>Sphenocichla humei</i>	楔头鹪鹛	Wedge-billed Wren-babbler
<i>Stachyris oglei</i>	奥氏穗鹛	Snowy-throated Babbler
<i>Actinodura nipalensis</i>	纹头斑翅鹛	Hoary-throated Barwing
<i>Actinodura waldeni</i>	纹胸斑翅鹛	Streak-throated Barwing
<i>Alcippe ludlowi</i>	路德雀鹛	Ludlow's Fulvetta
<i>Heterophasia gracilis</i>	灰奇鹛	Grey Sibia
<i>Heterophasia pulchella</i>	丽色奇鹛	Beautiful Sibia
<i>Yuhina bakeri</i>	白项凤鹛	White-naped Yuhina
<i>Phylloscopus cantator</i>	黄胸柳莺	Yellow-vented Warbler
<i>Tickellia hodgsoni</i>	宽嘴鹪莺	Broad-billed Warbler
<i>Sitta victoriae</i>	白眉鹇	White-browed Nuthatch

第133号特有鸟区 西藏南部

所在： 中国大陆

重要生境类型：针阔混交林林缘地带、灌丛、草原

海报范围：2,700–5,000 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (0)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Crossoptilon harmani</i>	藏马鸡	Tibetan Eared–pheasant
<i>Babax waddelli</i>	大草鹇	Giant Babax

第134号特有鸟区 西藏东部

所在： 中国大陆

重要生境类型：刺柏属/杜鹃花属灌丛、针叶混生林、树线以上的荒原

海拔范围：3,600–4,600 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (0)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Babax koslowi</i>	棕草鹇	Tibetan Babax
<i>Emberiza koslowi</i>	藏鹀	Tibetan Bunting

第135号特有鸟区 青海山区

所在： 中国大陆

重要生境类型：灌丛、多石地带、草坡，可能也包括针叶林

海拔范围：1,800–3,500 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (0)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Alectoris magna</i>	大石鸡	Rusty–necklaced Partridge
<i>Phoenicurus alaschanicus</i>	贺兰山红尾鹀	Ala Shan Redstart

第136号特有鸟区 晋冀山区

所在： 中国大陆

重要生境类型：阔叶林及针阔混交林

海拔范围：1,300–2,800 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (2)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (2)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	褐马鸡	Brown Eared–pheasant
<i>Turdus feae</i>	褐头鹟	Grey–sided Thrush

第137号特有鸟区 川中山区

所在： 中国大陆

重要生境类型：针叶林、阔叶林、及混有竹丛的针阔混交林

海报范围：1,500–3,700 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—10 (5)；出现于该特有鸟区的所有种类—11 (5)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Luscinia ruficeps</i>	棕头歌鸲	Rufous–headed Robin
<i>Luscinia obscura</i>	黑喉歌鸲	Black–throated Blue Robin
<i>Garrulax sukatschewi</i>	黑额山噪鹛	Snowy–cheeked Laughingthrush
<i>Garrulax lunulatus</i>	斑背噪鹛	Barred Laughingthrush
<i>Garrulax formosus</i>	丽色噪鹛	Red–winged Laughingthrush
<i>Paradoxornis paradoxus</i>	三趾鸦雀	Three–toed Parrotbill
<i>Paradoxornis zappeyi</i>	暗色鸦雀	Grey–hooded Parrotbill
<i>Paradoxornis przewalskii</i>	灰冠鸦雀	Rusty–throated Parrotbill
<i>Aegithalos fuliginosus</i>	银脸长尾山雀	White–necklaced Tit
<i>Parus davidi</i>	红腹山雀	Rusty–breasted Tit
<i>Latoucheornis siemsseni</i>	蓝鹇	Slaty Bunting

第138号特有鸟区 川西山区

所在： 中国大陆

重要生境类型：针叶林及针阔混交林；杜鹃花属植物林

海拔范围：2,700–4,900 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—2 (2)；出现于该特有鸟区的所有种类—2 (2)

注：Stattersfield *et al.* (1998) 将四川林鹞 *Strix davidi* 列为仅分布于此特有鸟区的（受胁）狭布种，但国际鸟盟（2001年、2004年）将其作为长尾林鹞 *S. Uralensis* 的一个亚种。

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Lophophorus lhuysii</i>	绿尾虹雉	Chinese Monal
<i>Perisoreus internigrans</i>	黑头噪鸦	Sichuan Jay

第139号特有鸟区 云南山区

所在： 中国大陆、缅甸

重要生境类型：针叶林及混交林、竹丛、灌丛

海拔范围：1,500–4,000 m

狭布种种数：仅分布于该特有鸟区的种类—3 (1)；出现于该特有鸟区的所有种类—3 (1)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Garrulax bieti</i>	白点鹟	White–speckled Laughingthrush
<i>Paradoxornis brunneus</i>	褐翅鹟雀	Brown–winged Parrotbill
<i>Sitta yunnanensis</i>	滇鹇	Yunnan Nuthatch

第140号特有鸟区 中国亚热带林区

所在： 中国大陆

重要生境类型： 亚热带阔叶林

海拔范围： 300–2,200 m

狭布种种数： 仅分布于该特有鸟区的种类—5 (4)；出现于该特有鸟区的所有种类—5 (4)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Arborophila rufipectus</i>	四川山鹧鸪	Sichuan Partridge
<i>Liocichla omeiensis</i>	灰胸薮鹛	Omei Shan Liocichla
<i>Alcippe variegaticeps</i>	金颊雀鹛	Gold-fronted Fulvetta
<i>Phylloscopus emeiensis</i>	峨眉柳莺	Emei Leaf Warbler
<i>Oriolus mellianus</i>	鹞色鹛	Silver Oriole

第141号特有鸟区 中国东南部山区

所在： 中国大陆

重要生境类型： 亚热带阔叶林、针阔混交林、针叶林

海拔范围： 300–1,900 m

狭布种种数： 仅分布于该特有鸟区的种类—4 (4)；出现于该特有鸟区的所有种类—5 (5)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Gorsachius magnificus</i>	海南鹞	White-eared Night-heron
<i>Arborophila gingica</i>	白眉山鹧鸪	White-necklaced Partridge
<i>Tragopan caboti</i>	黄腹角雉	Cabot's Tragopan
<i>Syrmaticus ellioti</i>	白颈长尾雉	Elliot's Pheasant
<i>Rhinomyias brunneata</i>	白喉林鹛	Brown-chested Jungle-flycatcher

第142号特有鸟区 海南

所在： 中国海南岛

重要生境类型： 山区常绿森林、低海拔常绿雨林

海拔范围： 600–1,800 m

狭布种种数： 仅分布于该特有鸟区的种类—2 (2)；出现于该特有鸟区的所有种类—4 (3)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Gorsachius magnificus</i>	海南鹞	White-eared Night-heron
<i>Arborophila ardens</i>	海南山鹧鸪	Hainan Partridge
<i>Phylloscopus hainanus</i>	海南柳莺	Hainan Leaf-warbler
<i>Sitta solangiae</i>	淡紫鹇	Yellow-billed Nuthatch

第149号特有鸟区 台湾

所在： 中国台湾岛

重要生境类型： 亚热带森林、针叶林及混交林

海拔范围： 0–3,900 m

狭布种种数： 仅分布于该特有鸟区的种类—14 (1)；出现于该特有鸟区的所有种类—15 (1)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Arborophila crudigularis</i>	台湾山鹧鸪	Taiwan Partridge
<i>Lophura swinhoii</i>	蓝鹇	Swinhoe's Pheasant
<i>Syrmaticus mikado</i>	黑长尾雉	Mikado Pheasant
<i>Treron formosae</i>	红顶绿鸠	Whistling Green-pigeon
<i>Pycnonotus taivanus</i>	台湾鹎	Taiwan Bulbul
<i>Myophonus insularis</i>	台湾紫啸鸫	Formosan Whistling-thrush
<i>Tarsiger johnstoniae</i>	台湾林鸫	Collared Bush-robin
<i>Garrulax morrisonianus</i>	玉山噪鹛	White-whiskered Laughingthrush
<i>Liocichla steerii</i>	黄痔薮鹛	Steere's Liocichla
<i>Actinodura morrisoniana</i>	台湾斑翅鹛	Formosan Barwing
<i>Heterophasia auricularis</i>	白耳奇鹛	White-eared Sibia
<i>Yuhina brunneiceps</i>	褐头凤鹛	Formosan Yuhina
<i>Regulus goodfellowi</i>	台湾戴菊	Flamecrest
<i>Parus holsti</i>	台湾黄山雀	Yellow Tit
<i>Urocissa caerulea</i>	台湾蓝鹇	Formosan Magpie

第s076号次等特有鸟区 南疆山区

所在： 中国大陆

狭布种种数： 仅分布于该次等特有鸟区的种类—1 (0)；出现于该次等特有鸟区的所有种类—1 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Leucosticte sillemi</i>	褐头岭雀	Sillem's Mountain-finch

第s078号二等特有鸟区 青藏高原北部

所在： 中国大陆

狭布种种数： 仅分布于该二等鸟区的种类—1 (0)；出现于该二等鸟区的所有种类—1 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Carpodacus roborowskii</i>	藏雀	Tibetan Rosefinch

第s093号次等特有鸟区 兰屿

所在： 中国台湾岛

狭布种种数： 仅分布于该二等鸟区的种类—0；出现于该二等鸟区的所有种类—2 (0)

拉丁文名	中文名	英文名
<i>Treron formosae</i>	红顶绿鸠	Whistling Green-pigeon
<i>Otus elegans</i>	兰屿角鸮	Elegant Scops-owl

■ 附录4 中国境内出现的局限分布于特定生物群系的鸟类名录，按其所在的生物群系分列。

本附录记录了各生物群系的地理位置（所在的国家或地区名称以粗体标出）、其中的重要生境、及其与特有鸟区或二等鸟区（参见附录2）在地域上的交叉情况。各生物群系的鸟类名录都特别标出了其中的狭布种，并用粗体对受胁鸟种进行了标识。需要注意的是，某些生物群系的鸟类名录中含有一些在中国境内没有记录的鸟种。尽管事实证明本书对生物群系的研究分析是中肯有力的，但在此提供的某些生物群系的鸟类名录还需要进一步的修订（例如应该去掉那些已经适应人工化生境、因此分布已不仅限于其当前所归入的生物群系中特征性生境的鸟种。）

注：

- 名录中鸟类包括一些在国内还没有记录的鸟类
- 因为名录太长，只列出原文拉丁学名

AS02 寒带森林（泰加林）

说明：生境类型包括针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、与森林相连的苔原和疏树草原（以及相连的湿地）。地域范围横贯俄罗斯，经蒙古北部、中国大陆东北部，延伸至日本北部（在亚洲版图以外，还延伸至欧洲北部和北美）。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：无。

AS02	<i>Tringa ochropus</i>	
<i>Podiceps auritus</i>	<i>Xenus cinereus</i>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
<i>Cygnus cygnus</i>	<i>Calidris subminuta</i>	
<i>Anas falcata</i>	<i>Brachyramphus marmoratus</i>	<i>Muscicapa griseisticta</i>
<i>Anas penelope</i>	<i>Strix uralensis</i>	
<i>Bucephala clangula</i>	<i>Strix nebulosa</i>	<i>Parus cinctus</i>
<i>Mergellus albellus</i>	<i>Surnia ulula</i>	
<i>Haliaeetus pelagicus</i>	<i>Glaucidium passerinum</i>	<i>Emberiza chrysophrys</i>
<i>Dendragapus falcipennis</i>	<i>Bombycilla garrulus</i>	
<i>Tetrao urogallus</i>	<i>Bombycilla japonica</i>	<i>Emberiza aureola</i>
<i>Tetrao parvirostris</i>	<i>Prunella montanella</i>	
<i>Grus grus</i>	<i>Zoothera sibirica</i>	<i>Emberiza pallasi</i>
<i>Grus monacha</i>	<i>Turdus hortulorum</i>	
<i>Gallinago stenura</i>	<i>Turdus obscurus</i>	<i>Leucosticte arctoa</i>
<i>Gallinago megala</i>	<i>Turdus naumanni</i>	
<i>Gallinago media</i>	<i>Luscinia sibilans</i>	<i>Pinicola enucleator</i>
<i>Lymnocyptes minimus</i>	<i>Luscinia cyane</i>	
<i>Numenius madagascariensis</i>	<i>Locustella lanceolata</i>	<i>Perisoreus infaustus</i>
<i>Tringa nebularia</i>	<i>Locustella ochotensis</i>	

AS03 亚洲东北部温带森林

说明：生境类型主要为阔叶林和针阔混交林（以及相连的湿地）。地域范围包括俄罗斯远东地区、日本、中国大陆东北部、朝鲜、韩国、以及蒙古东部。

交叉的特有鸟区和二等鸟区：S088：萨哈林；S089：本州岛中部低海拔森林；S090：本州岛中部山区森林。

<i>Gorsachius goesagi</i>	<i>Motacilla lugens</i>	<i>Phylloscopus coronatus</i>
<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	<i>Motacilla grandis</i>	<i>Megalurus pryeri</i>
<i>Ciconia boyciana</i>	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	<i>Ficedula zanthopygia</i>
<i>Nipponia nippon</i>	<i>Ixos amaurotis</i>	<i>Ficedula narcissina</i>
<i>Aix galericulata</i>	<i>Lanius tigrinus</i>	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>

<i>Aythya baeri</i>	<i>Lanius bucephalus</i>	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>
<i>Mergus squamatus</i>	<i>Prunella rubida</i>	<i>Remiz consobrinus</i>
<i>Butastur indicus</i>	<i>Monticola gularis</i>	<i>Parus varius</i>
<i>Syrmaticus soemmerringii</i>	<i>Turdus cardis</i>	<i>Zosterops erythroleurus</i>
<i>Grus japonensis</i>	<i>Turdus pallidus</i>	<i>Emberiza jankowskii</i>
<i>Porzana paykullii</i>	<i>Turdus chrysolaus</i>	<i>Emberiza tristrami</i>
<i>Charadrius placidus</i>	<i>Erithacus akahige</i>	<i>Emberiza sulphurata</i>
<i>Vanellus cinereus</i>	<i>Paradoxornis webbianus</i>	<i>Emberiza variabilis</i>
<i>Gallinago hardwickii</i>	<i>Paradoxornis heudei</i>	<i>Emberiza yessoensis</i>
<i>Tringa guttifer</i>	<i>Urosphena squameiceps</i>	<i>Eophona migratoria</i>
<i>Ketupa blakistoni</i>	<i>Cettia canturians</i>	<i>Eophona personata</i>
<i>Dendrocopos kizuki</i>	<i>Cettia diphone</i>	<i>Sturnus sturninus</i>
<i>Picus awokera</i>	<i>Locustella pleskei</i>	<i>Sturnus philippensis</i>
<i>Alauda japonica</i>	<i>Acrocephalus tangorum</i>	<i>Sturnus cineraceus</i>
<i>Dendronanthus indicus</i>	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	

AS04 欧亚大陆草原和沙漠

说明：生境类型有疏树草原、与森林相连的疏树草原（forest steppe）、咸水湖、咸水沼泽、沙漠（包括沙丘、石滩、沙原、绿洲）以及半沙漠地带的灌丛。地域范围包括俄罗斯南部、蒙古、以及中国大陆北部（在亚洲版图以外，还横贯中亚延伸至东欧、中东、以及北非边缘）。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：127塔克拉玛干沙漠。

<i>Circus macrourus</i>	<i>Grus vipio</i>	
<i>Circus melanoleucos</i>	<i>Tetrax tetrax</i>	<i>Vanellus gregarius</i>
<i>Aquila nipalensis</i>	<i>Otis tarda</i>	<i>Charadrius veredus</i>
<i>Perdix dauurica</i>	<i>Charadrius leschenaultii</i>	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>
<i>Grus vipio</i>	<i>Charadrius asiaticus</i>	<i>Columba eversmanni</i>
<i>Caprimulgus centralasicus</i>	<i>Oenanthe pleschanka</i>	<i>Limnodromus semipalmatus</i>
<i>Dendrocopos leucopterus</i>	<i>Acrocephalus agricola</i>	<i>Montifringilla davidiana</i>
<i>Melanocorypha mongolica</i>	<i>Parus bokharensis</i>	<i>Sturnus roseus</i>
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	<i>Emberiza bruniceps</i>	<i>Podoces hendersoni</i>
<i>Anthus godlewskii</i>	<i>Passer ammodendri</i>	<i>Podoces biddulphi</i>

AS05 欧亚大陆高山区（高山地带及青藏高原）

说明：生境类型主要是树线及之上的灌丛和开阔地带，包括高山和亚高山的灌丛和草甸、岩壁和多石山坡、以及山区湿地等。主要分布在海拔约3,600 m以上，地域范围包括横贯俄罗斯东南部、蒙古西部和中国大陆西北部的阿尔泰–萨彦山系（Altay–Sayan），中国大陆的天山山脉和青藏高原，以及巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸等国的北部（即跨喜马拉雅地区Trans–Himalayan）（在亚洲版图以外，还延伸至中亚、中东、以及欧洲地区）。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：133：西藏南部；134：西藏东部；S076：南疆山区；S077：蒙古山区；S078：青藏高原北部。

<i>Gyps himalayensis</i>	<i>Prunella himalayana</i>	<i>Emberiza koslowi</i>
<i>Lerwa lerwa</i>	<i>Prunella rubeculoides</i>	<i>Leucosticte nemoricola</i>
<i>Tetraogallus tibetanus</i>	<i>Prunella ocularis</i>	<i>Leucosticte brandti</i>
<i>Tetraogallus altaicus</i>	<i>Prunella fulvescens</i>	<i>Leucosticte sillemi</i>
<i>Tetraogallus himalayensis</i>	<i>Prunella koslowi</i>	<i>Rhodopechys sanguinea</i>
<i>Perdix hodgsoniae</i>	<i>Zoothera mollissima</i>	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>
<i>Crossoptilon harmani</i>	<i>Turdus kessleri</i>	<i>Carpodacus eos</i>
<i>Grus nigricollis</i>	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>
<i>Gallinago solitaria</i>	<i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	<i>Carpodacus rubicilloides</i>
<i>Gallinago nemoricola</i>	<i>Grandala coelicolor</i>	<i>Carpodacus rubicilla</i>

<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	<i>Saxicola insignis</i>	<i>Carpodacus puniceus</i>
<i>Larus brunnicephalus</i>	<i>Garrulax henrici</i>	<i>Carpodacus roborowskii</i>
<i>Syrrhaptes tibetanus</i>	<i>Babax waddelli</i>	<i>Urocynchramus pylzowi</i>
<i>Columba leuconota</i>	<i>Babax koslowi</i>	<i>Montifringilla nivalis</i>
<i>Melanocorypha maxima</i>	<i>Leptopoecile sophiae</i>	<i>Montifringilla adamsi</i>
<i>Calandrella acutirostris</i>	<i>Phylloscopus fuligiventer</i>	<i>Montifringilla taczanowskii</i>
<i>Anthus roseatus</i>	<i>Phylloscopus affinis</i>	<i>Montifringilla ruficollis</i>
<i>Anthus spinoletta</i>	<i>Phylloscopus griseolus</i>	<i>Montifringilla blanfordi</i>
<i>Lanius tephronotus</i>	<i>Parus superciliosus</i>	<i>Pseudopodoces humilis</i>
<i>Prunella collaris</i>	<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Pyrrhcorax graculus</i>

AS07 中国 – 喜马拉雅温带森林

说明：生境类型包括常绿阔叶林、落叶阔叶林、针阔混交林、针叶林、以及山区草甸（montane grassland）。主要分布在海拔1,800–3600 m之间，地域范围包括中国大陆南部和西部、巴基斯坦和印度的北部、尼泊尔、及不丹等国境内位于青藏高原边缘的山区，孟加拉国、缅甸、中国台湾、老挝北部、泰国、越南境内的山区，以及俄罗斯东南部、蒙古西部、中国大陆西北部境内的阿尔泰-萨彦岭山脉和天山山脉（在亚洲版图以外，还延伸至阿富汗和中亚地区）。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：128：喜马拉雅西部山区；129：喜马拉雅中部山区；130：喜马拉雅东部山区；135：青海山区；136：晋冀山区；137：川中山区；138：川西山区；139：云南山区；s082：Fan Si Pan及老挝北部。

<i>Bonasa sewerzowi</i>	<i>Prunella strophiatea</i>	<i>Garrulax ocellatus</i>
<i>Tetraophasis obscurus</i>	<i>Prunella atrogularis</i>	<i>Garrulax lineatus</i>
<i>Tetraophasis szechenyii</i>	<i>Prunella immaculata</i>	<i>Garrulax virgatus</i>
<i>Alectoris magna</i>	<i>Zoothera dixonii</i>	<i>Garrulax austeni</i>
<i>Arborophila torqueola</i>	<i>Zoothera monticola</i>	<i>Garrulax subunicolor</i>
<i>Arborophila mandellii</i>	<i>Turdus albocinctus</i>	<i>Garrulax elliotii</i>
<i>Ophrysia superciliosa</i>	<i>Turdus rubrocanus</i>	<i>Garrulax variegatus</i>
<i>Ithaginis cruentus</i>	<i>Turdus feae</i>	<i>Garrulax affinis</i>
<i>Tragopan melanocephalus</i>	<i>Brachypteryx stellata</i>	<i>Garrulax formosus</i>
<i>Tragopan satyra</i>	<i>Brachypteryx hyperythra</i>	<i>Xiphirhynchus superciliaris</i>
<i>Tragopan blythii</i>	<i>Luscinia pectoralis</i>	<i>Pnoepyga albiventer</i>
<i>Tragopan temminckii</i>	<i>Luscinia ruficeps</i>	<i>Pnoepyga immaculata</i>
<i>Pucrasia macrolopha</i>	<i>Luscinia obscura</i>	<i>Spelaeornis caudatus</i>
<i>Lophophorus impejanus</i>	<i>Luscinia pectardens</i>	<i>Spelaeornis badeigularis</i>
<i>Lophophorus sclateri</i>	<i>Luscinia brunnea</i>	<i>Spelaeornis troglodytoides</i>
<i>Lophophorus lhuysii</i>	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	<i>Spelaeornis formosus</i>
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	<i>Tarsiger indicus</i>	<i>Spelaeornis chocolatinus</i>
<i>Crossoptilon manchuricum</i>	<i>Tarsiger hyperythrus</i>	<i>Spelaeornis longicaudatus</i>
<i>Crossoptilon auritum</i>	<i>Phoenicurus alaschanicus</i>	<i>Sphenocichla humei</i>
<i>Catreus wallichi</i>	<i>Phoenicurus erythronotus</i>	<i>Stachyris oglei</i>
<i>Chrysolophus amherstiae</i>	<i>Phoenicurus caeruleocephala</i>	<i>Chrysomma poecilotis</i>
<i>Columba hodgsonii</i>	<i>Phoenicurus schisticeps</i>	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>
<i>Psittacula derbiana</i>	<i>Hodgsonius phaenicuroides</i>	<i>Turdoides nipalensis</i>
<i>Apus acuticauda</i>	<i>Garrulax albogularis</i>	<i>Actinodura nipalensis</i>
<i>Harpactes wardi</i>	<i>Garrulax striatus</i>	<i>Actinodura waldeni</i>
<i>Indicator xanthonotus</i>	<i>Garrulax sukatschewi</i>	<i>Actinodura souliei</i>
<i>Dendrocopos darjellensis</i>	<i>Garrulax lunulatus</i>	<i>Minla strigula</i>
<i>Dendrocopos himalayensis</i>	<i>Garrulax bieti</i>	<i>Minla ignotincta</i>
<i>Delichon nipalensis</i>	<i>Garrulax maximus</i>	<i>Alcippe chrysotis</i>
<i>Alcippe vinipectus</i>	<i>Phylloscopus magnirostris</i>	<i>Sitta leucopsis</i>
<i>Alcippe striaticollis</i>	<i>Phylloscopus tyleri</i>	<i>Certhia himalayana</i>
<i>Alcippe ruficapilla</i>	<i>Phylloscopus occipitalis</i>	<i>Certhia nipalensis</i>

<i>Alcippe ludlowi</i>	<i>Phylloscopus cantator</i>	<i>Dicaeum melanoxanthum</i>
<i>Heterophasia capistrata</i>	<i>Seicercus poliogenys</i>	<i>Aethopyga ignicauda</i>
<i>Heterophasia gracilis</i>	<i>Tickellia hodgsoni</i>	<i>Latoucheornis siemsseni</i>
<i>Heterophasia pulchella</i>	<i>Muscicapa ruficauda</i>	<i>Serinus thibetanus</i>
<i>Yuhina bakeri</i>	<i>Muscicapa ferruginea</i>	<i>Carduelis spinoides</i>
<i>Yuhina gularis</i>	<i>Ficedula hodgsonii</i>	<i>Carduelis ambigua</i>
<i>Yuhina diademata</i>	<i>Ficedula strophiatea</i>	<i>Callacanthis burtoni</i>
<i>Yuhina occipitalis</i>	<i>Ficedula subrubra</i>	<i>Carpodacus rubescens</i>
<i>Myzornis pyrrhoura</i>	<i>Ficedula superciliaris</i>	<i>Carpodacus nipalensis</i>
<i>Conostoma oemodium</i>	<i>Ficedula tricolor</i>	<i>Carpodacus rodochroa</i>
<i>Paradoxornis paradoxus</i>	<i>Ficedula sapphira</i>	<i>Carpodacus vinaceus</i>
<i>Paradoxornis unicolor</i>	<i>Niltava sundara</i>	<i>Carpodacus edwardsii</i>
<i>Paradoxornis conspicillatus</i>	<i>Aegithalos leucogenys</i>	<i>Carpodacus trifasciatus</i>
<i>Paradoxornis brunneus</i>	<i>Aegithalos niveogularis</i>	<i>Carpodacus rodopeplus</i>
<i>Paradoxornis zappeyi</i>	<i>Aegithalos iouschistos</i>	<i>Carpodacus thura</i>
<i>Paradoxornis przewalskii</i>	<i>Aegithalos fuliginosus</i>	<i>Pinicola subhimachalus</i>
<i>Paradoxornis fulvifrons</i>	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	<i>Haematospiza sipahi</i>
<i>Tesia castaneocoronata</i>	<i>Parus davidi</i>	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
<i>Tesia cyaniventer</i>	<i>Parus rufonuchalis</i>	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>
<i>Cettia major</i>	<i>Parus rubidiventris</i>	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>
<i>Cettia flavolivacea</i>	<i>Parus melanolophus</i>	<i>Pyrrhula erythaca</i>
<i>Cettia acanthizoides</i>	<i>Parus dichrous</i>	<i>Mycerobas icterioides</i>
<i>Cettia brunnifrons</i>	<i>Parus monticolus</i>	<i>Mycerobas affinis</i>
<i>Bradypterus major</i>	<i>Parus flavipectus</i>	<i>Mycerobas melanozanthos</i>
<i>Leptopoecile elegans</i>	<i>Sylviparus modestus</i>	<i>Mycerobas carnipes</i>
<i>Phylloscopus subaffinis</i>	<i>Sitta cashmirensis</i>	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>
<i>Phylloscopus pulcher</i>	<i>Sitta himalayensis</i>	<i>Perisoreus internigrans</i>
<i>Phylloscopus maculipennis</i>	<i>Sitta victoriae</i>	<i>Urocissa flavirostris</i>
<i>Phylloscopus subviridis</i>	<i>Sitta yunnanensis</i>	

AS08中国 – 喜马拉雅亚热带森林

说明：生境类型包括较低海拔山区森林、丘陵地带常绿森林、及松林。主要分布在山麓下丘陵地带至海拔2,000 m之间，地域范围包括中国大陆东南部、中国台湾，以及巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹等国境内的喜马拉雅山脉下丘陵地带，和孟加拉国、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南境内的山区。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：140：中国亚热带林区；141：中国东南部山区；142：海南；145：大叻高原；149：中国台湾岛；s080：缅甸—泰国山区；s083：老挝南部；s084：昆嵩高原；s085：泰国—柬埔寨山区。

<i>Gorsachius magnificus</i>	<i>Megalaima incognita</i>	<i>Turdus dissimilis</i>
<i>Microhierax melanoleucos</i>	<i>Dendrocopos atratus</i>	<i>Turdus boulboul</i>
<i>Arborophila rufogularis</i>	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	<i>Turdus mupinensis</i>
<i>Arborophila crudigularis</i>	<i>Pitta nipalensis</i>	<i>Tarsiger johnstoniae</i>
<i>Arborophila rufipectus</i>	<i>Pitta soror</i>	<i>Cinclidium leucurum</i>
<i>Arborophila gingica</i>	<i>Pitta oatesi</i>	<i>Cinclidium frontale</i>
<i>Arborophila cambodiana</i>	<i>Pitta nympha</i>	<i>Enicurus schistaceus</i>
<i>Arborophila ardens</i>	<i>Coracina melaschistos</i>	<i>Cochoa purpurea</i>
<i>Bambusicola fytchii</i>	<i>Pericrocotus roseus</i>	<i>Cochoa viridis</i>
<i>Bambusicola thoracica</i>	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	<i>Garrulax perspicillatus</i>
<i>Tragopan caboti</i>	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	<i>Garrulax strepitans</i>
<i>Lophura nycthemera</i>	<i>Spizixos canifrons</i>	<i>Garrulax milleti</i>
<i>Lophura swinhoii</i>	<i>Spizixos semitorques</i>	<i>Garrulax maesi</i>
<i>Syrmaticus ellioti</i>	<i>Pycnonotus striatus</i>	<i>Garrulax vassali</i>
<i>Syrmaticus humiae</i>	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	<i>Garrulax galbanus</i>

<i>Syrmaticus mikado</i>	<i>Pycnonotus sinensis</i>	<i>Garrulax gularis</i>
<i>Syrmaticus reevesii</i>	<i>Pycnonotus taivanus</i>	<i>Garrulax cineraceus</i>
<i>Chrysolophus pictus</i>	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	<i>Garrulax rufogularis</i>
<i>Amaurornis bicolor</i>	<i>Pycnonotus flavescens</i>	<i>Garrulax caerulatus</i>
<i>Treron seimundi</i>	<i>Alophoixus flaveolus</i>	<i>Garrulax poecilorhynchus</i>
<i>Treron formosae</i>	<i>Hemixos castanonotus</i>	<i>Garrulax merulinus</i>
<i>Psittacula himalayana</i>	<i>Hypsipetes mcclellandii</i>	<i>Garrulax canorus</i>
<i>Psittacula finschii</i>	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	<i>Garrulax sannio</i>
<i>Chrysococcyx maculatus</i>	<i>Hypsipetes thompsoni</i>	<i>Garrulax squamatus</i>
<i>Otus elegans</i>	<i>Chloropsis hardwickii</i>	<i>Garrulax morrisonianus</i>
<i>Batrachostomus hodgsoni</i>	<i>Lanius collurio</i> ides	<i>Garrulax yersini</i>
<i>Alcedo hercules</i>	<i>Monticola cinclorhynchus</i>	<i>Garrulax milnei</i>
<i>Anorrhinus austeni</i>	<i>Myophonus insularis</i>	<i>Liocichla phoenicea</i>
<i>Aceros nipalensis</i>	<i>Zoothera wardii</i>	<i>Liocichla omeiensis</i>
<i>Megalaima franklinii</i>	<i>Zoothera marginata</i>	<i>Liocichla steerii</i>
<i>Megalaima asiatica</i>	<i>Turdus unicolor</i>	<i>Pellorneum albiventre</i>
<i>Pomatorhinus erythrocnemis</i>	<i>Yuhina castaniceps</i>	<i>Niltava macgrigoriae</i>
<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	<i>Yuhina humilis</i>	<i>Niltava davidi</i>
<i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>	<i>Yuhina brunneiceps</i>	<i>Aegithalos concinnus</i>
<i>Napothera brevicaudata</i>	<i>Yuhina nigrimenta</i>	<i>Parus venustus</i>
<i>Stachyris ruficeps</i>	<i>Paradoxornis gularis</i>	<i>Parus spilonotus</i>
<i>Stachyris pyrrhops</i>	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	<i>Parus holsti</i>
<i>Babax lanceolatus</i>	<i>Paradoxornis alphonsianus</i>	<i>Sitta solangiae</i>
<i>Leiothrix lutea</i>	<i>Paradoxornis verreauxi</i>	<i>Sitta magna</i>
<i>Cutia nipalensis</i>	<i>Paradoxornis davidianus</i>	<i>Sitta formosa</i>
<i>Pteruthius rufiventer</i>	<i>Paradoxornis atosuperciliaris</i>	<i>Aethopyga christinae</i>
<i>Gampsorhynchus rufulus</i>	<i>Paradoxornis ruficeps</i>	<i>Aethopyga saturata</i>
<i>Actinodura egertoni</i>	<i>Regulus goodfellowi</i>	<i>Arachnothera magna</i>
<i>Actinodura ramsayi</i>	<i>Prinia crinigera</i>	<i>Carduelis monguilloti</i>
<i>Actinodura morrisoniana</i>	<i>Tesia olivea</i>	<i>Saroglossa spiloptera</i>
<i>Minla cyanouroptera</i>	<i>Cettia pallidipes</i>	<i>Sturnus sericeus</i>
<i>Alcippe variegaticeps</i>	<i>Phylloscopus emeiensis</i>	<i>Sturnus sinensis</i>
<i>Alcippe cinerea</i>	<i>Phylloscopus davisoni</i>	<i>Oriolus tenuirostris</i>
<i>Alcippe cinereiceps</i>	<i>Phylloscopus hainanus</i>	<i>Oriolus traillii</i>
<i>Alcippe brunnea</i>	<i>Phylloscopus ricketti</i>	<i>Oriolus mellianus</i>
<i>Alcippe peracensis</i>	<i>Seicercus xanthoschistos</i>	<i>Garrulus lanceolatus</i>
<i>Alcippe morrisonia</i>	<i>Seicercus affinis</i>	<i>Urocissa caerulea</i>
<i>Alcippe nipalensis</i>	<i>Abroscopus albogularis</i>	<i>Urocissa whiteheadi</i>
<i>Crocias langbianis</i>	<i>Abroscopus schisticeps</i>	<i>Cissa hypoleuca</i>
<i>Heterophasia annectens</i>	<i>Rhinomyias brunneata</i>	<i>Dendrocitta formosae</i>
<i>Heterophasia melanoleuca</i>	<i>Muscicapa muttui</i>	<i>Dendrocitta frontalis</i>
<i>Heterophasia auricularis</i>	<i>Ficedula monileger</i>	<i>Corvus torquatus</i>

AS09 中南半岛潮湿热带森林

说明：生境类型主要为低海拔常绿和半常绿森林，以及潮湿的落叶林。分布在约海拔1,000 m以下，地域范围包括尼泊尔和不丹南部、孟加拉国、印度东北部、中国大陆南部、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、和越南。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：143：安南低海拔地带；144：越南南部低海拔地带；S079：缅甸北部低海拔地带。

<i>Ardea insignis</i>	<i>Arborophila davidi</i>	<i>Lophura hatinhensis</i>
<i>Arborophila atrogularis</i>	<i>Arborophila chloropus</i>	<i>Lophura diardi</i>
<i>Arborophila brunneopectus</i>	<i>Lophura edwardsi</i>	<i>Polyplectron germaini</i>
<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	<i>Pitta phayrei</i>	<i>Napothera crispifrons</i>

<i>Rheinardia ocellata</i>	<i>Pitta cyanea</i>	<i>Stachyris herberti</i>
<i>Heliopais personata</i>	<i>Pitta elliotii</i>	<i>Macronous kelleyi</i>
<i>Columba punicea</i>	<i>Pitta moluccensis</i>	<i>Alcippe rufogularis</i>
<i>Carpococcyx renauldi</i>	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	<i>Prinia cinereocapilla</i>
<i>Megalaima lagrandieri</i>	<i>Iole virescens</i>	<i>Cyornis hainanus</i>
<i>Megalaima faiostricta</i>	<i>Iole propinqua</i>	<i>Cyornis poliogenys</i>
<i>Picus viridanus</i>	<i>Enicurus immaculatus</i>	<i>Melanochlora sultanea</i>
<i>Picus rabieri</i>	<i>Garrulax monileger</i>	<i>Sturnus burmannicus</i>
<i>Dinopium shorii</i>	<i>Garrulax pectoralis</i>	<i>Ampeliceps coronatus</i>
<i>Gecinulus grantia</i>	<i>Garrulax ruficollis</i>	<i>Dicrurus annectans</i>
<i>Gecinulus viridis</i>	<i>Garrulax nuchalis</i>	<i>Temnurus temnurus</i>
<i>Meiglyptes jugularis</i>	<i>Garrulax chinensis</i>	

AS11 印度－马来半岛热带干旱区

说明：生境类型包括干旱落叶林、干旱常绿林、热带旱生林、干旱灌丛、长有树林的草原、以及多种人工化的生境（如农田等）。分布在巴基斯坦、印度、斯里兰卡（干旱区）、尼泊尔和不丹南部、孟加拉国、中国大陆南部、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、马来西亚、及印度尼西亚（仅爪哇省）。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：132：伊洛瓦底平原；s071：Eastern Andhra Pradesh；s072：德干高原南部。

<i>Pseudibis papillosa</i>	<i>Pavo muticus</i>	<i>Picus erythropygius</i>
<i>Gyps bengalensis</i>	<i>Sypheotides indica</i>	<i>Dinopium benghalense</i>
<i>Gyps indicus</i>	<i>Vanellus malarbaricus</i>	<i>Chrysocolaptes festivus</i>
<i>Gyps tenuirostris</i>	<i>Rhinoptilus bitorquatus</i>	<i>Mirafra erythroptera</i>
<i>Sarcogyps calvus</i>	<i>Cursorius coromandelicus</i>	<i>Mirafra assamica</i>
<i>Butastur teesa</i>	<i>Treron phoenicoptera</i>	<i>Eremopterix grisea</i>
<i>Butastur liventer</i>	<i>Psittacula cyanocephala</i>	<i>Calandrella raytal</i>
<i>Polihierax insignis</i>	<i>Psittacula roseata</i>	<i>Galerida malabarica</i>
<i>Falco chicquera</i>	<i>Phaenicophaeus leschenaultii</i>	<i>Galerida deva</i>
<i>Francolinus pictus</i>	<i>Bubo coromandus</i>	<i>Coracina polioptera</i>
<i>Coturnix coromandelica</i>	<i>Strix ocellata</i>	<i>Coracina melanoptera</i>
<i>Perdica asiatica</i>	<i>Caprimulgus asiaticus</i>	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>
<i>Perdica argoondah</i>	<i>Ocyceros birostris</i>	<i>Pericrocotus erythropygius</i>
<i>Perdica erythrorhyncha</i>	<i>Megalaima zeylanica</i>	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>
<i>Galloperdix lunulata</i>	<i>Megalaima lineata</i>	<i>Pycnonotus aurigaster</i>
<i>Pavo cristatus</i>	<i>Dendrocopos mahrattensis</i>	<i>Pycnonotus xantholaemus</i>
<i>Pycnonotus luteolus</i>	<i>Prinia polychroa</i>	<i>Passer flaveolus</i>
<i>Pycnonotus blanfordi</i>	<i>Prinia buchanani</i>	<i>Sturnus malabaricus</i>
<i>Aegithina nigrolutea</i>	<i>Prinia sylvatica</i>	<i>Sturnus pagodarum</i>
<i>Saxicoloides fulcata</i>	<i>Prinia socialis</i>	<i>Sturnus nigricollis</i>
<i>Cercomela fusca</i>	<i>Rhipidura aureola</i>	<i>Sturnus melanopterus</i>
<i>Dumetia hyperythra</i>	<i>Parus nuchalis</i>	<i>Acridotheres ginginianus</i>
<i>Turdoides gularis</i>	<i>Amandava formosa</i>	<i>Dicrurus caerulescens</i>
<i>Turdoides malcolmi</i>	<i>Lonchura leucogastroides</i>	<i>Artamus fuscus</i>
<i>Turdoides striatus</i>	<i>Lonchura ferruginosa</i>	<i>Crypsirina temia</i>
<i>Turdoides affinis</i>	<i>Padda oryzivora</i>	<i>Crypsirina cucullata</i>

AS12 印度－恒河平原

说明：生境类型包括季节性淹没的草原、沼泽地带生长的灌丛、以及相连的湿地。分布在巴基斯坦、印度北部、尼泊尔和不丹南部、孟加拉国、中国大陆最南端、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南等国的平原上。

交叉的特有鸟区和次等特有鸟区：131：阿萨姆邦平原；S074：印度河平原。

<i>Francolinus gularis</i>	<i>Chrysomma altirostre</i>	<i>Graminicola bengalensis</i>
<i>Perdicula manipurensis</i>	<i>Turdoides earlei</i>	<i>Passer pyrrhonotus</i>
<i>Houbaropsis bengalensis</i>	<i>Turdoides longirostris</i>	<i>Ploceus benghalensis</i>
<i>Saxicola leucura</i>	<i>Paradoxornis flavirostris</i>	<i>Ploceus megarhynchus</i>
<i>Saxicola jerdoni</i>	<i>Prinia burnesii</i>	<i>Acridotheres albocinctus</i>
<i>Pellorneum palustre</i>	<i>Chaetornis striatus</i>	

■ 附录 5 在中国境内经常性出现的集群性水鸟种类名录（依照Rose and Scott 1997及Wetlands International 2002对水鸟的定义），以及重点鸟区A4类别第一条标准中使用的各鸟种“生物地理种群1%” 阈值。

本附录中的1%阈值是针对鸟类的个体数量（而非配对后对数）而言，对繁殖种群和非繁殖种群都适用。方法学一章中介绍了这些阈值的估算方法。本书采用湿地国际于2002年公布的最新种群估计数据，对各鸟种在中亚－南亚迁徙路线和东亚迁徙路线的种群均估算出了1%的阈值（本附录中分别以“SA”和“EA”两列表示）。对一些在通常情况下不集大群生活的水鸟，比如许多秧鸡类鸟种（Rallidae），我们没有计算相应的阈值；这些鸟种的名录列在本附录最后。此外，全球性受胁鸟种（依照国际鸟盟2004年出版的受胁鸟类名录）在本附录中以粗体标出。

表中“参考资料” 一列的数字代表以下一些用于估算1%阈值的水鸟种群资料来源：（1）Rose and Scott (1997)；（2）del Hoyo *et al.* (1992)；（3）del Hoyo *et al.* (1996)；（4）本目录编纂总负责小组的估算，大多以欧洲和非洲的1%阈值作为参考；（5）P. Rose *in litt.* (1997)；（6）Wetlands International (2002)。

拉丁文名	中文名	英文名	SA	EA	参考资料
<i>Gavia stellata</i>	红喉潜鸟	Red-throated Loon		250	6
<i>Gavia arctica</i>	黑喉潜鸟	Arctic Loon		5000	6
<i>Gavia pacifica</i>	太平洋潜鸟	Pacific Loon		500	6
<i>Gavia adamsii</i>	白嘴潜鸟	Yellow-billed Loon		50	6
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	小鸕鷀	Little Grebe	5000	5000	6
<i>Podiceps grisegena</i>	赤颈鸕鷀	Red-necked Grebe	50	500	6
<i>Podiceps cristatus</i>	凤头鸕鷀	Great Crested Grebe	150	250	6
<i>Podiceps auritus</i>	角鸕鷀	Horned Grebe	150	500	6
<i>Podiceps nigricollis</i>	黑颈鸕鷀	Black-necked Grebe	250	250	6
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	白鹈鹕	Great White Pelican	230		6
<i>Pelecanus crispus</i>	卷羽鹈鹕	Dalmatian Pelican	40	40	6
<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	海鸬鹚	Pelagic Cormorant		1000	2,6
<i>Phalacrocorax niger</i>	黑颈鸬鹚	Little Cormorant	1500	500	6
<i>Phalacrocorax carbo</i>	普通鸬鹚	Great Cormorant	500	500	6
<i>Phalacrocorax capillatus</i>	暗绿背鸬鹚	Japanese Cormorant		500	6
<i>Phalacrocorax urile</i>	红脸鸬鹚	Red-faced Cormorant		2000	6
<i>Anhinga melanogaster</i>	黑腹蛇鹈	Oriental Darter	40	40	6
<i>Egretta garzetta</i>	白鹭	Little Egret	600	5000	6
<i>Egretta eulophotes</i>	黄嘴白鹭	Chinese Egret		30	6
<i>Egretta sacra</i>	岩鹭	Pacific Reef-egret	5000	5000	6
<i>Ardea cinerea</i>	苍鹭	Grey Heron	200	5000	6
<i>Ardea purpurea</i>	草鹭	Purple Heron	250	250	6
<i>Ardea picata</i>	白颈黑鹭	Pied Heron		5000	6
<i>Casmerodius albus</i>	大白鹭	Great Egret	250	250	6
<i>Mesophoyx intermedia</i>	中白鹭	Intermediate Egret	250	250	6
<i>Bubulcus ibis</i>	牛背鹭	Cattle Egret	10000	5000	6
<i>Ardeola bacchus</i>	池鹭	Chinese Pond-heron	1000	1000	6
<i>Butorides striatus</i>	绿鹭	Striated Heron	250	250	6
<i>Nycticorax nycticorax</i>	夜鹭	Black-crowned Night-heron	500	5000	6
<i>Gorsachius magnificus</i>	海南鸛	White-eared Night-heron		1	6
<i>Gorsachius goisagi</i>	栗鸛	Japanese Night-heron		6	6
<i>Gorsachius melanolophus</i>	黑冠鸛	Malaysian Night-heron	100	100	6
<i>Ixobrychus minutus</i>	小苇鸛	Little Bittern	150		6
<i>Ixobrychus sinensis</i>	黄苇鸛	Yellow Bittern	5000	5000	6
<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	紫背苇鸛	Schrenck's Bittern		100	6
<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	栗苇鸛	Cinnamon Bittern	1000	5000	6

中国大陆的重点鸟区名录

拉丁文名	中文名	英文名	SA	EA	参考资料
<i>Ixobrychus flavicollis</i>	黑鹇	Black Bittern	500	250	6
<i>Botaurus stellaris</i>	大麻鹇	Great Bittern	1000	500	6
<i>Mycteria leucocephala</i>	彩鹇	Painted Stork	150	100	6
<i>Ciconia nigra</i>	黑鹳	Black Stork	50	1	6
<i>Ciconia ciconia</i>	红嘴白鹳	White Stork	45		6
<i>Ciconia boyciana</i>	东方白鹳	Oriental Stork	30	30	6
<i>Leptoptilos javanicus</i>	秃鹳	Lesser Adjutant	50	50	6
<i>Plegadis falcinellus</i>	彩鹳	Glossy Ibis	150	150	6
<i>Threskiornis melanocephalus</i>	黑头白鹳	Black-headed Ibis	50	50	6
<i>Nipponia nippon</i>	朱鹳	Crested Ibis		1	6
<i>Platalea leucorodia</i>	白琵鹭	Eurasian Spoonbill	230	65	6
<i>Platalea minor</i>	黑脸琵鹭	Black-faced Spoonbill		10	6
<i>Phoenicopterus roseus</i>	大红鹳	Greater Flamingo	2900		6
<i>Dendrocygna javanica</i>	栗树鸭	Lesser Whistling-duck	5000	5000	6
<i>Oxyura leucocephala</i>	白头硬尾鸭	White-headed Duck	1	1	6
<i>Cygnus olor</i>	疣鼻天鹅	Mute Swan		20	6
<i>Cygnus cygnus</i>	大天鹅	Whooper Swan		600	6
<i>Cygnus columbianus</i>	小天鹅	Tundra Swan		860	6
<i>Anser cygnoides</i>	鸿雁	Swan Goose		550	6
<i>Anser fabalis</i>	豆雁	Bean Goose		600	6
<i>Anser albifrons</i>	白额雁	Greater White-fronted Goose	150	1300	6
<i>Anser erythropus</i>	小白额雁	Lesser White-fronted Goose	110	140	6
<i>Anser anser</i>	灰雁	Greylag Goose	150	750	6
<i>Anser indicus</i>	斑头雁	Bar-headed Goose	560	560	6
<i>Chen caerulescens</i>	雪雁	Snow Goose		1100	6
<i>Branta bernicla</i>	黑雁	Brent Goose		50	6
<i>Tadorna ferruginea</i>	赤麻鸭	Ruddy Shelduck	500	750	6
<i>Tadorna tadorna</i>	翘鼻麻鸭	Common Shelduck	500	1300	6
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	瘤鸭	Comb Duck	60	60	6
<i>Nettapus coromandelianus</i>	棉凫	Cotton Pygmy-goose	500	1000	6
<i>Aix galericulata</i>	鸳鸯	Mandarin Duck		400	6
<i>Anas strepera</i>	赤膀鸭	Gadwall	1500	7500	6
<i>Anas falcata</i>	罗纹鸭	Falcated Duck	350	350	6
<i>Anas penelope</i>	赤颈鸭	Eurasian Wigeon	2500	7500	6
<i>Anas platyrhynchos</i>	绿头鸭	Mallard	750	15000	6
<i>Anas poecilorhyncha</i>	斑嘴鸭	Spot-billed Duck	500	12000	6
<i>Anas clypeata</i>	琵嘴鸭	Northern Shoveler	5000	7500	6
<i>Anas acuta</i>	针尾鸭	Northern Pintail	10000	7500	6
<i>Anas querquedula</i>	白眉鸭	Garganey	2500	5000	6
<i>Anas formosa</i>	花脸鸭	Baikal Teal	3000	3000	6
<i>Anas crecca</i>	绿翅鸭	Eurasian Teal	4000	8000	6
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	云石斑鸭	Marbled Teal	50		6
<i>Netta rufina</i>	赤嘴潜鸭	Red-crested Pochard	500	500	6
<i>Aythya ferina</i>	红头潜鸭	Common Pochard	5000	8000	6
<i>Aythya nyroca</i>	白眼潜鸭	Ferruginous Duck	1000	1000	6
<i>Aythya baeri</i>	青头潜鸭	Baer's Pochard	150	150	6
<i>Aythya fuligula</i>	凤头潜鸭	Tufted Duck	5000	7500	6
<i>Aythya marila</i>	斑背潜鸭	Greater Scaup		3000	6
<i>Polysticta stelleri</i>	小绒鸭	Steller's Eider		1800	6
<i>Histrionicus histrionicus</i>	丑鸭	Harlequin Duck		500	6
<i>Clangula hyemalis</i>	长尾鸭	Long-tailed Duck		7500	6
<i>Melanitta nigra</i>	黑海番鸭	Black Scoter		5000	6
<i>Melanitta fusca</i>	斑脸海番鸭	White-winged Scoter		8000	6

中国大陆的重点鸟区名录

拉丁文名	中文名	英文名	SA	EA	参考资料
<i>Bucephala clangula</i>	鹄鸭	Common Goldeneye	250	750	6
<i>Mergellus albellus</i>	白秋沙鸭	Smew		500	6
<i>Mergus serrator</i>	红胸秋沙鸭	Red-breasted Merganser		500	6
<i>Mergus squamatus</i>	中华秋沙鸭	Scaly-sided Merganser		40	6
<i>Mergus merganser</i>	普通秋沙鸭	Common Merganser	60	750	6
<i>Grus leucogeranus</i>	白鹤	Siberian Crane	1	30	6
<i>Grus antigone</i>	赤颈鹤	Sarus Crane	90	10	6
<i>Grus vipio</i>	白枕鹤	White-naped Crane		40	6
<i>Grus canadensis</i>	沙丘鹤	Sandhill Crane		25	1,3,5
<i>Grus virgo</i>	蓑羽鹤	Demoiselle Crane	1000	850	6
<i>Grus grus</i>	灰鹤	Common Crane	700	110	6
<i>Grus monacha</i>	白头鹤	Hooded Crane		85	6
<i>Grus nigricollis</i>	黑颈鹤	Black-necked Crane	60	60	6
<i>Grus japonensis</i>	丹顶鹤	Red-crowned Crane		10	6
<i>Amaurornis phoenicurus</i>	白胸苦恶鸟	White-breasted Waterhen	10000	10000	6
<i>Gallicrex cinerea</i>	董鸡	Watercock	500	500	4
<i>Porphyrio porphyrio</i>	紫水鸡	Purple Swamphen	10000	10000	6
<i>Gallinula chloropus</i>	黑水鸡	Common Moorhen	10000	10000	4
<i>Fulica atra</i>	骨顶鸡	Common Coot	15000	10000	6
<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	水雉	Pheasant-tailed Jacana	500	500	6
<i>Metopidius indicus</i>	铜翅水雉	Bronze-winged Jacana	1000	1000	3,4
<i>Rostratula benghalensis</i>	彩鹪	Greater Painted-snipe	1000	1000	4
<i>Haematopus ostralegus</i>	蛎鹬	Eurasian Oystercatcher	1500	100	6
<i>Pluvialis fulva</i>	金斑鸻	Pacific Golden-plover	750	1000	6
<i>Pluvialis squatarola</i>	灰斑鸻	Grey Plover	300	1300	6
<i>Charadrius hiaticula</i>	剑鸻	Common Ringed Plover	2100		6
<i>Charadrius placidus</i>	长嘴剑鸻	Long-billed Plover	50	50	6
<i>Charadrius dubius</i>	金眶鸻	Little Ringed Plover	500	500	6
<i>Charadrius alexandrinus</i>	环颈鸻	Kentish Plover	500	1000	6
<i>Charadrius mongolus</i>	蒙古沙鸻	Mongolian Plover	1000	1000	6
<i>Charadrius leschenaultii</i>	铁嘴沙鸻	Greater Sand Plover	500	1000	6
<i>Charadrius asiaticus</i>	红胸鸻	Caspian Plover	480	480	6
<i>Charadrius veredus</i>	东方鸻	Oriental Plover		700	6
<i>Eudromias morinellus</i>	小嘴鸻	Eurasian Dotterel		250	6
<i>Vanellus vanellus</i>	凤头麦鸡	Northern Lapwing	150	500	6
<i>Vanellus duvaucelii</i>	距翅麦鸡	River Lapwing	100	100	6
<i>Vanellus cinereus</i>	灰头麦鸡	Grey-headed Lapwing	500	500	6
<i>Vanellus indicus</i>	肉垂麦鸡	Red-wattled Lapwing	1500	1500	3
<i>Gallinago solitaria</i>	孤沙锥	Solitary Snipe	250	50	6
<i>Gallinago hardwickii</i>	澳南沙锥	Latham's Snipe		500	6
<i>Gallinago nemoricola</i>	林沙锥	Wood Snipe	60	60	6
<i>Gallinago stenura</i>	针尾沙锥	Pintail Snipe	1000	1000	6
<i>Gallinago megala</i>	大沙锥	Swinhoe's Snipe	500	500	6
<i>Gallinago gallinago</i>	扇尾沙锥	Common Snipe	10000	5000	6
<i>Lymnocyrtes minimus</i>	姬鹬	Jack Snipe	660	50	3,4
<i>Limosa limosa</i>	黑尾膝鹬	Black-tailed Godwit	1000	1600	6
<i>Limosa lapponica</i>	斑尾膝鹬	Bar-tailed Godwit	1300	1500	6
<i>Numenius minutus</i>	小杓鹬	Little Curlew		1800	6
<i>Numenius phaeopus</i>	中杓鹬	Whimbrel	500	550	6
<i>Numenius arquata</i>	白腰杓鹬	Eurasian Curlew	250	350	6
<i>Numenius madagascariensis</i>	大杓鹬	Far Eastern Curlew		380	6
<i>Tringa erythropus</i>	鹤鹬	Spotted Redshank	150	500	6
<i>Tringa totanus</i>	红脚鹬	Common Redshank	5000	250	6

拉丁文名	中文名	英文名	SA	EA	参考资料
<i>Tringa stagnatilis</i>	泽鹞	Marsh Sandpiper	1000	900	6
<i>Tringa nebularia</i>	青脚鹞	Common Greenshank	250	550	6
<i>Tringa guttifer</i>	小青脚鹞	Spotted Greenshank	6	6	6
<i>Tringa ochropus</i>	白腰草鹞	Green Sandpiper	1000	500	6
<i>Tringa glareola</i>	林鹞	Wood Sandpiper	5000	1000	6
<i>Xenus cinereus</i>	翘嘴鹞	Terek Sandpiper	250	500	6
<i>Actitis hypoleucos</i>	矶鹞	Common Sandpiper	1000	3000	6
<i>Heteroscelus brevipes</i>	灰尾漂鹞	Grey-tailed Tattler		400	6
<i>Heteroscelus incanus</i>	漂鹞	Wandering Tattler		150	6
<i>Arenaria interpres</i>	翻石鹞	Ruddy Turnstone	250	500	6
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	长嘴鹞	Long-billed Dowitcher		5000	6
<i>Limnodromus semipalmatus</i>	半蹼鹞	Asian Dowitcher	230	230	6
<i>Calidris tenuirostris</i>	大滨鹞	Great Knot	35	3800	6
<i>Calidris canutus</i>	红腹滨鹞	Red Knot	3400	2200	6
<i>Calidris alba</i>	三趾鹞	Sanderling	500	220	6
<i>Calidris mauri</i>	西方滨鹞	Western Sandpiper		20000	6
<i>Calidris minuta</i>	小滨鹞	Little Stint	2000	2000	6
<i>Calidris ruficollis</i>	红颈滨鹞	Rufous-necked Stint	3200	3200	6
<i>Calidris temminckii</i>	青脚滨鹞	Temminck's Stint	500	250	6
<i>Calidris subminuta</i>	长趾滨鹞	Long-toed Stint	500	500	6
<i>Calidris melanotos</i>	斑胸滨鹞	Pectoral Sandpiper		500	6
<i>Calidris acuminata</i>	尖尾滨鹞	Sharp-tailed Sandpiper		1600	6
<i>Calidris ptilocnemis</i>	岩滨鹞	Rock Sandpiper		650	6
<i>Calidris alpina</i>	黑腹滨鹞	Dunlin	500	5000	6
<i>Calidris ferruginea</i>	弯嘴滨鹞	Curlew Sandpiper	1000	1800	6
<i>Tryngites subruficollis</i>	饰胸鹞	Buff-breasted Sandpiper		150	6
<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>	勺嘴鹞	Spoon-billed Sandpiper	30	30	6
<i>Limicola falcinellus</i>	阔嘴鹞	Broad-billed Sandpiper	630	250	6
<i>Philomachus pugnax</i>	流苏鹞	Ruff	500	500	6
<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	鸛嘴鹞	Ibisbill	250	250	4
<i>Himantopus himantopus</i>	黑翅长脚鹞	Black-winged Stilt	5000	500	6
<i>Recurvirostra avosetta</i>	反嘴鹞	Pied Avocet	250	500	6
<i>Glareola pratincola</i>	领燕鸻	Collared Pratincole	250		6
<i>Glareola maldivarum</i>	普通燕鸻	Oriental Pratincole	1000	750	6
<i>Glareola lactea</i>	灰燕鸻	Small Pratincole	250	250	6
<i>Phalaropus lobatus</i>	红颈瓣蹼鹞	Red-necked Phalarope	10000	10000	6
<i>Phalaropus fulicaria</i>	灰瓣蹼鹞	Grey Phalarope	5000	5000	6
<i>Larus crassirostris</i>	黑尾鸥	Black-tailed Gull		1600	6
<i>Larus canus</i>	海鸥	Mew Gull	5000	5000	6
<i>Larus glaucescens</i>	灰翅鸥	Glaucous-winged Gull		5700	6
<i>Larus hyperboreus</i>	北极鸥	Glaucous Gull		600	3
<i>Larus argentatus</i>	银鸥	Herring Gull		2000	3,6
<i>Larus heuglini</i>	灰林银鸥	Heuglin's Gull	2000	2000	3,6
<i>Larus schistisagus</i>	灰背鸥	Slaty-backed Gull		1000	6
<i>Larus cachinnans</i>	黄脚银鸥	Yellow-legged Gull	5000	5000	6
<i>Larus ichthyætus</i>	渔鸥	Great Black-headed Gull	500	500	6
<i>Larus brunnicephalus</i>	棕头鸥	Brown-headed Gull	1000	1000	6
<i>Larus ridibundus</i>	红嘴鸥	Common Black-headed Gull	1000	10000	6
<i>Larus genei</i>	细嘴鸥	Slender-billed Gull	1500		6
<i>Larus saundersi</i>	黑嘴鸥	Saunders's Gull		85	6
<i>Larus relictus</i>	遗鸥	Relict Gull		120	6
<i>Larus minutus</i>	小鸥	Little Gull		50	6
<i>Rhodostethia rosea</i>	楔尾鸥	Ross's Gull		500	6

拉丁文名	中文名	英文名	SA	EA	参考资料
<i>Rissa tridactyla</i>	三趾鸥	Black-legged Kittiwake		20000	6
<i>Sterna nilotica</i>	鸥嘴噪鸥	Gull-billed Tern	500	250	6
<i>Sterna caspia</i>	红嘴巨鸥	Caspian Tern	250	150	6
<i>Sterna aurantia</i>	黄嘴河燕鸥	River Tern	250	250	6
<i>Sterna bengalensis</i>	小凤头燕鸥	Lesser Crested-tern	1700	600	3,4
<i>Sterna bergii</i>	大凤头燕鸥	Great Crested-tern	200	200	3
<i>Sterna bernsteini</i>	黑嘴端凤头燕鸥	Chinese Crested-tern		1	6
<i>Sterna dougallii</i>	粉红燕鸥	Roseate Tern	50	200	3
<i>Sterna sumatrana</i>	黑枕燕鸥	Black-naped Tern	150	150	3,4
<i>Sterna hirundo</i>	普通燕鸥	Common Tern	250	1000	6
<i>Sterna albifrons</i>	白额燕鸥	Little Tern	250	250	6
<i>Sterna acuticauda</i>	尖尾燕鸥	Black-bellied Tern	150	150	6
<i>Sterna aleutica</i>	白腰燕鸥	Aleutian Tern		330	6
<i>Sterna anaethetus</i>	褐翅燕鸥	Bridled Tern	5000	1000	3
<i>Sterna fuscata</i>	乌燕鸥	Sooty Tern	20000	20000	6
<i>Chlidonias hybrida</i>	须浮鸥	Whiskered Tern	500	5000	6
<i>Chlidonias leucopterus</i>	白翅浮鸥	White-winged Tern	1000	1000	6
<i>Chlidonias niger</i>	黑浮鸥	Black Tern	4000	4000	6
<i>Anous stolidus</i>	白顶玄鸥	Brown Noddy	7500	7500	3,4
<i>Gygis alba</i>	白玄鸥	Common White-tern	5000		6
<i>Rynchops albicollis</i>	剪嘴鸥	Indian Skimmer	60	60	6

■ 附录6 经常性地在亚洲境内繁殖的集群性海鸟种类名录，以及重点鸟区A4类别第二条标准中使用的各鸟种“全球种群1%” 阈值。

本附录仅列出了不包括在水鸟范畴内的海鸟种类（依照Rose and Scott 1997及Wetlands International 2002对水鸟的定义）。其中的1%阈值针对鸟类的配对后对数（而非个体数量）而言，适用于繁殖种群。方法学一章中介绍了这些阈值的估算方法。对一些尚未在亚洲境内有繁殖记录的海鸟，我们没有计算相应的阈值。此外，全球性受胁鸟种（按照国际鸟盟2004年出版的受胁鸟类名录）在本附录中以粗体标出。

表中“参考资料” 一列的数字代表以下一些用于估算1%阈值的海鸟种群资料来源：（1）del Hoyo *et al.* (1992)；（2）del Hoyo *et al.* (1996)；（3）Collar *et al.* (1994)；（4）Brazil (1991)；（5）M. Brooke *in litt.* (1996)。

拉丁文名	中文名	英文名	全球种群1%阈值
<i>Phoebastria albatrus</i>	短尾信天翁	Short-tailed Albatross	1
<i>Phoebastria nigripes</i>	黑脚信天翁	Black-footed Albatross	400
<i>Fulmarus glacialis</i>	暴雪鰲	Northern Fulmar	40,000
<i>Pterodroma hypoleuca</i>	点额圆尾鰲	Bonin Petrel	3,500
<i>Bulweria bulwerii</i>	纯褐鰲	Bulwer's Petrel	1,300
<i>Calonectris leucomelas</i>	白额鰲	Streaked Shearwater	15,000
<i>Puffinus pacificus</i>	曳尾鰲	Wedge-tailed Shearwater	15,000
<i>Puffinus lherminieri</i>	奥氏鰲	Audubon's Shearwater	300
<i>Oceanodroma castro</i>	斑腰叉尾海燕	Band-rumped Storm-petrel	250
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	白腰叉尾海燕	Leach's Storm-petrel	40,000
<i>Oceanodroma monorhis</i>	黑叉尾海燕	Swinhoe's Storm-petrel	100
<i>Oceanodroma tristrami</i>	褐翅叉尾海燕	Tristram's Storm-petrel	100
<i>Oceanodroma matsudairae</i>	烟黑叉尾海燕	Matsudaira's Storm-petrel	100
<i>Oceanodroma furcata</i>	灰蓝叉尾海燕	Fork tailed Storm-petrel	15,000
<i>Phaethon rubricauda</i>	红尾鹲	Red-tailed Tropicbird	160

拉丁文名	中文名	英文名	全球种群1%阈值
<i>Phaethon lepturus</i>	白尾鹲	White-tailed Tropicbird	250
<i>Sula dactylatra</i>	蓝脸鲣鸟	Masked Booby	1,000
<i>Sula sula</i>	红脚鲣鸟	Red-footed Booby	3,000
<i>Sula leucogaster</i>	褐鲣鸟	Brown Booby	1,000
<i>Fregata minor</i>	小军舰鸟	Great Frigatebird	1,700
<i>Fregata ariel</i>	白斑军舰鸟	Lesser Frigatebird	1,000
<i>Fregata andrewsi</i>	白腹军舰鸟	Christmas Island Frigatebird	16
<i>Alle alle</i>	侏海雀	Dovekie	120,000
<i>Uria aalge</i>	崖海鸦	Common Murre	90,000
<i>Uria lomvia</i>	厚嘴崖海鸦	Thick-billed Murre	110,000
<i>Cephus grylle</i>	白翅斑海鸽	Black Guillemot	2,700
<i>Cephus columba</i>	海鸽	Pigeon Guillemot	2,300
<i>Cephus carbo</i>	白眶海鸽	Spectacled Guillemot	720
<i>Brachyramphus perdix</i>	长嘴斑海雀	Long-billed Murrelet	1,500
<i>Brachyramphus brevirostris</i>	小嘴斑海雀	Kittlitz's Murrelet	100
<i>Synthliboramphus antiquus</i>	扁嘴海雀	Ancient Murrelet	5,000
<i>Synthliboramphus wumizusume</i>	冠海雀	Japanese Murrelet	15
<i>Aethia psittacula</i>	白腹海鸮	Parakeet Auklet	4,000
<i>Aethia cristatella</i>	凤头海雀	Crested Auklet	41,000
<i>Aethia pygmaea</i>	须海雀	Whiskered Auklet	500
<i>Aethia pusilla</i>	小海雀	Least Auklet	120,000
<i>Cerorhinca monocerata</i>	角嘴海雀	Rhinoceros Auklet	4,000
<i>Fratercula corniculata</i>	角海鸮	Horned Puffin	4,000
<i>Fratercula cirrhata</i>	簇羽海鸮	Tufted Puffin	12,000

参考文献

葛汉栋（1996）关于湖南湿地利用与保护。林业部野生动物与森林植物保护司主编。湿地保护与合理利用中国湿地保护研讨论文集。53–57页。中国林业出版社，北京。

国家环保总局自然生态保护司（2006）。全国自然保护区名录(2005)。环境科学出版社，北京。

何山春、张善武、江国胜（1996）。安徽湿地现状。林业部野生动物与森林植物保护司主编。湿地保护与合理利用中国湿地保护研讨论文集。406–412页。中国林业出版社，北京。

李文革、李晓民（2001）哈拉海湿地的鹤类资源。黑龙江大学自然科学学报2001年第4期。

李晓民、崔长顺、张华、王新建（2003）。黑龙江省八岔岛自然保护区秋冬季水禽资源调查。中国鹤类通讯（7）:1. 1–2。

刘乃发主编（2001）甘肃敦煌自然保护区科学考察。中国林业出版社，北京。

刘务林（1999）羌塘–世界上最后的净土。中国林业出版社，北京。

鹿守本（1996）中国沿海湿地开发利用。林业部野生动物与森林植物保护司主编。湿地保护与合理利用中国湿地保护研讨论文集。41–45页。中国林业出版社，北京。

马建章（主编）(1992) 自然保护区学。东北林业大学出版社，哈尔滨。

王作义（1996）江西省湿地管理现状及对策。林业部野生动物与森林植物保护司主编。湿地保护与合理利用中国湿地保护研讨论文集。418–421页。中国林业出版社，北京。

张蕾、王宏祥主编（2000）中国林业普法教育读本。中国林业法律实用手册。中国林业出版社，北京。

朱惊毅、方嗣昭、李兴中、陈椽（1998）贵州湿地。中国林业出版社，北京。

Barter, M. (2002) Shorebirds of the Yellow Sea: Importance, threats and conservation status. Canberra, Australia: Wetlands International Global Series 9, International Water Studies 12.

Han Lianxian and Han Ben (2007) Habitat status, distribution and regional population assessment of Giant Nuthatch in central and south Yunnan. A progress report for the RSPB.

Wu Xizhou, Sun Jiayan and Tan Yingchun (2004) Heilongjiang Daily article quoting 904 Geology Survey Institute of 904 Hydrology Project, Heilongjiang. (downloaded on 20 April 2004 from: http://app.wildlifeplant.gov.cn/enterprise/jsp/)



封面照片提供：

- ▶ 1:2006年上海市中国鸟类节的IBA展览（摄影：姚力）
- ▶ 2:2006年2月在上海市的崇明东滩自然保护区（第375号重点鸟区）出现的约八千只花脸鸭，是近年在韩国以外越冬地难得一见的大群（摄影：章克家）
- ▶ 3:上海博物馆2006年展出的战国时代初期宴乐狩猎水陆攻战纹壶，显示两千多年前水鸟与中原人民的生活息息相关（摄影：陈承彦）
- ▶ 4:重点鸟区不但对保护鸟类重要——四川省的瓦屋山自然保护区（第207号重点鸟区）的小熊猫（摄影：王吉衣）
- ▶ 5:中国观鸟行列的壮大2007年7月在四川省白水河保护区（第199号重点鸟区）举办的野外考察培训班（摄影：苏毅雄）
- ▶ 6:湖北省的神农架（第348号重点鸟区）（摄影：李明璞）
- ▶ 7:云南省的南滚河（第255号重点鸟区）（摄影：冯利民）
- ▶ 8:河南省的郑州黄河湿地（第338号重点鸟区）迁徙路过的灰鹤群（摄影：王恒瑞）
- ▶ 9:四川省的卧龙自然保护区（第201号重点鸟区）(摄影：董磊)
- ▶ 10:分布于中国-喜马拉雅山温带丛林的橙翅噪鹛（摄影：韩联宪）
- ▶ 11:国际濒危的白头硬尾鸭，新疆自治区的乌鲁木齐北郊——达阪城荒漠与湿地（第097号重点鸟区）是它们在世界上最东的繁殖区之一（摄影：苟军）
- ▶ 12:山西省的芦芽山（第305号重点鸟区）（摄影：胡少荣）
- ▶ 13:分布于中国-喜马拉雅山温带丛林的四川雉鹑（摄影：张永）
- ▶ 14:国际重要湿地及小白额雁的重要越冬地——洞庭湖国家级自然保护区（第438号重点鸟区）的水牛（摄影：陈承彦）
- ▶ 15:云南省的高黎贡山（第244号重点鸟区）的一种斑蛾*Campylotes histrionicus*（摄影：王瑞卿）
- ▶ 16:培育关心鸟类的下一代：成都观鸟会送给小朋友的鸟类识别小册（摄影：陈承彦）
- ▶ 17:青海省的青海湖鸟岛（第156号重点鸟区），是重要的水鸟繁殖地（摄影：李鹏）
- ▶ 18:福建省的闽江河口（第411号重点鸟区），国际重要的水鸟栖息地（摄影：杨金）
- ▶ 19:母亲河的上游：甘肃省黄河首曲地区的草原（第166号重点鸟区）（摄影：华方圆）
- ▶ 20:母亲河入海处：山东省黄河三角洲的丹顶鹤（第327号重点鸟区）（摄影：丁洪安）
- ▶ 21:广西壮族自治区的弄岗（第482号重点鸟区）（摄影：田穗兴）