


甘肃省



黄河首曲（第166号重点鸟区），位于甘南藏区，与四川的若尔盖相连。（华方圆摄影）



甘肃重点鸟区分布图

重点鸟区编号：CN159

名称：敦煌保护区及西祁连山（Dunhuang Nature Reserve and Western Qilian Shan Mountains）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3 A4iii

面积：约7,280,000公顷

座标：39° 00'N 96° 25'E

海拔高度：1,100-5,798 米

保护状况：1982年建立肃北盐池湾、敦煌湾腰墩、阿克塞安南坝三个省级自然保护区，2000年将这3个保护区合并，并加上马鬃山地区，建立了敦煌国家级自然保护区。其他保护区包括1987年建立的省级盐池湾自然保护区（面积424,800公顷），1987年于阿克塞县建立的大苏干湖省级自然保护区（面积9,640公顷），以及同年于阿克塞县建立的小苏干湖自然保护区（面积2,400公顷）等

地区描述：位于甘肃省西部，与青海省为邻，包括党河南山、疏勒河南山、野马山。属温带高寒半干旱气候，人口稀少，只有少量农业，以牧业为主。区内植被以草原荒漠为主，另有草甸、灌丛和阔叶林。南山（祁连山）和北山（马鬃山）间是候鸟的迁徙要道

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：青头潜鸭（易危）、玉带海雕（易危）、白肩雕（易危）、黄爪隼（易危）、黑颈鹤（易危）、遗鸥（易危）、贺兰山红尾鸽（近危）。青头潜鸭1985年11月在肃北县芦苇沟采集得2只标本；玉带海雕自80年代开始数量锐减，现已罕见；白肩雕记录于肃北、阿克赛，已甚少见；黑颈鹤1997年于大小苏干湖调查记录到5-6只；遗鸥1985年11月在苏干湖采集得标本，但标本尚需重新鉴定
- 特有鸟区：135青海山区
- 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国-喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：国家保护动物包括雪豹、猞猁、兔狲、藏野驴、蒙古野驴、野骆驼、马麝、白唇鹿、野牦牛、藏原羚、盘羊、岩羊等



西祁连山（第159号重点鸟区），除了对鸟类重要，还是很多大型兽类的栖息地。（钟嘉摄影）

重点鸟区编号：CN160

名称：金塔（Jinta）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4iii

面积：约1,800,000公顷

座标：40° 30'N 99° 12'E

海拔高度：1,000-1,924 米

保护状况：未受到保护

地区描述：位于甘肃西北部，北部与东部与内蒙古额洛旗相邻。生境类型以荒漠和草原为主，湿地只占该区面积的5%。黑河（旧称弱水）从中流过形成相当面积的湿地，也有多座人工湿地水库，包括鸳鸯池、营盘水库、芨芨水库、清水湾水库、沙枣墩水库等。这些水库呈念珠状排列，连绵130多公里

对鸟类重要性简述：

- 据刘乃发1988年调查，迁徙季节时有不少于20,000只候鸟飞经此地。主要种类有黑鹤、灰雁、赤麻鸭、赤嘴潜鸭、鳊、白骨顶、黑翅长脚鹬以及其它鹤鹬类及鸥类
- 区内分布的国际性受胁鸟类：中亚鸽（易危）、大鸨（易危）。中亚鸽于1984年采得标本，当时可见4-6只小群；大鸨20世纪50-60年代在沿河地区繁殖，迁徙时可见上百只，但自70年代后已绝迹
- 生物群系：AS04 欧亚大陆草原和沙漠

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN161

名称：东祁连山（Eastern Qilian Shan Mountains）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：4,284,000公顷

座标：38° 15'N 101° 00'E

海拔高度：2,250-4,850 米

保护状况：1987年建立祁连山省级自然保护区（面积2,653,023公顷），1988年升级为国家级自然保护区。1997年省人大常委会29次会议通过祁连山保护区的管理条例

地区描述：位于甘肃西北部，由一系列西北东南走向的山脉组成，是青藏高原和蒙新高原的界山。生境以草原为主（约占七成），余下针叶林与农地各半

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：玉带海雕（易危）、白肩雕（易危）、黑颈鹤（易危）、中亚鸽（易危）。玉带海雕以往偶尔可见，现在数量锐减，很难见到；白肩雕1984年于此地采得幼体标本一只；黑颈鹤1982年于祁连县见7只；中亚鸽1983年11月于天祝、肃南采得标本，并见到4-5只的小群
- 特有鸟区：135青海山区
- 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国-喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN162

名称：民勤〔Minqin〕

中国大陆的重点鸟区名录

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：约1,600,000公顷

座标：38° 47'N 103° 15'E

海拔高度：1,100–1,950 米

保护状况：1982年建立连古城国家级保护区（面积389,883公顷）

地区描述：位于甘肃北部，北与内蒙古相邻。主要是荒漠草原景观，地势平坦，石军河流经该区，沿河有西马湖水库、紫湖水库、红崖水库，还有几片盐碱湿地

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：大鸨（易危）、中亚鸽（易危）。大鸨于20世纪50–60年代甚多，但现在少见，1990年5月在白碱草原见到脚印

● 生物群系：AS04 欧亚大陆草原和沙漠

其它重要动植物简述：连古城自然保护区重点保护对象是黄羊

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：36° 20'N 103° 59'E

海拔高度：1,300–3,400 米

保护状况：1995年永靖县建立黄河三峡省级湿地自然保护区（面积19,500公顷）；1985年榆中县建立兴隆山省级自然保护区（面积33,301公顷），1988年升级为国家级自然保护区；1985年永登县建立市级竹林沟自然保护区（面积6,306公顷）

地区描述：位于甘肃省中部，接近省会兰州。黄土高原地貌，沟壑纵横，黄河从本区中部流过，境内有刘家峡水库。区内主要为农地

对鸟类重要性简述：

● 迁徙季节经过本区的水鸟在20,000只以上

● 区内分布的国际性受胁鸟类：青头潜鸭（易危）、玉带海雕（易危）、白肩雕（易危）、大鸨（易危）。玉带海雕20世纪50年代常见，现已极少；白肩雕为此地的罕见冬候鸟；大鸨20世纪50年代数量较多，可集成几十只的大群，80年代起已甚少见

● 特有鸟区：135青海山区

● 生物群系：AS04 欧亚大陆草原和沙漠、AS07 中国–喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：34° 56'N 103° 42'E

海拔高度：1,750–3,810 米

保护状况：1983年建立莲花山自然保护区,2003年升级为国家级自然保护区（11,691公顷）

地区描述：位于康乐南端，临潭北端，主要为山地与高原地形。

植被以针叶林和针阔混交林为主，间有草原及农地。北部有一高山湖（常爷池）有迁飞水鸟30种以上

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黑额山噪鹛（易危）

● 特有鸟区：137川中山区

● 生物群系：AS07 中国–喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

名称：甘丽尕海–则岔（Ganligahai – Zecha）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3 A4i A4iii

面积：247,431公顷

座标：34° 14'N 102° 19'E

海拔高度：2,900–3,450 米

保护状况：尕海在1982年被列为省级自然保护区（面积34,000公顷），1997年升级为国家级自然保护区，面积扩大至247,431公顷

地区描述：位于碌曲县，南与四川为邻。尕海是个高原湖泊，明水面面积约5平方公里，平均水深2–3米。湖水来自降水和山泉，外泄入洮河。该地区人口稀疏，以牧为主，无工农业。但过度放牧令草场退化，沙化加剧

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黑颈鹤（易危）、黑头噪鸦（易危）。黑颈鹤据1996年7月统计在该区有80–82只

● 特有鸟区：137川中山区、138川西山区

● 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国–喜马拉雅温带森林

● 区内分布数量超过中亚–南亚种群1%的鸟类：黑颈鹤、红脚鹬（据观察在尕海边的沼泽地区繁殖密度达0.6只/公顷，在整个区域数量不会少于20,000只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：33° 30'N 102° 15'E

海拔高度：约3,450 米

保护状况：1992年建立省级自然保护区，面积375,000公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：位于玛曲县以南，东与四川若尔盖湿地相连，为一沼泽湿地和草原。黄河从本区东部流过，漫溢开成沼泽。本地人口不多，多为藏族，以牧为主

对鸟类重要性简述：

● 据1997年4–6月间调查（王丕贤未发表），春季有不少于20,000只水鸟迁徙过境，主要种类有灰雁、斑头雁、大天鹅、赤麻鸭、针尾鸭、绿翅鸭、赤颈鸭、灰鹤、红脚鹬、棕头鸭、普通燕鸥等

● 受胁鸟类：玉带海雕（易危）、黑颈鹤（易危）。黑颈鹤据估

计至少有60只

● 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：34° 28'N 103° 21'E

海拔高度：2,100–4,630 米

保护状况：1982年建立郭扎沟紫果云杉省级自然保护区（面积2,687公顷），在本鸟区之内

地区描述：位于甘南藏族自治州卓尼县南部，洮河南。主要生境类型是草地，间有树林和农地

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白肩雕（易危）、黑额山噪鹛（易危）、灰冠鸦雀（易危）、黑头噪鸦（易危）

● 特有鸟区：137川中山区、138川西山区

● 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国–喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：区内有中国特产稀有树种紫果云杉

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：33° 50'N 103° 40'E

海拔高度：1,200–4,504 米

保护状况：未受到保护

地区描述：包括舟曲西南部和迭部县南部，北以白龙江为界，东南以文县为邻，南与四川毗连。在岷山山系的北部，山大沟深

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：绿尾虹雉（易危）、黑额山噪鹛（易危）、灰冠鸦雀（易危）、黑头噪鸦（易危）

● 特有鸟区：137川中山区、138川西山区

● 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国–喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：32° 46'N 104° 45"E

海拔高度：1,500–3,100 米

保护状况：1963年建立白水江国家级自然保护区。在2000年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：位于文县南部，南与四川为邻，境内主要山脉为摩天岭，为岷山脉东部支脉。区内以温带针阔混交林和针叶林、灌林和草原为主，人烟稀少，农地面积比例不足10%。1974–75年甘肃省林业厅资助兰州大学调查本区鸟类，1992–95年由林业部（现

中国大陆的重点鸟区名录

国家林业局）资助进行保护综合科学考察，1998年开始国家林业局资助研究大熊猫食性

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：玉带海雕（易危）、绿尾虹雉（易危）、黑额山噪鹛（易危）。玉带海雕据1992–95年调查，偶尔遇见；绿尾虹雉据1992–95年调查，数量较少；黑额山噪鹛近年没有记录

● 特有鸟区：135青海山区、137川中山区、138川西山区

● 生物群系：AS07 中国–喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：有中国国家保护鸟类28种、保护兽类28种

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

名称：龙神沟自然保护区（Longshengou Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：6,667公顷

座标：32° 59'N 105° 46'E

海拔高度：610–1,200米

保护状况：1986年建立龙神沟县级自然保护区

地区描述：位于康县南部，与陕西为邻，为低山丘陵地貌。植被以温带高山阔叶落叶林为主（约占一半），其余为温带灌林和农地。20世纪60及70年代西北师范大学曾在此调查鸟类；1993–95年兰州大学在此开展了白冠长尾雉的调查

对鸟类重要性简述：

● 是白冠长尾雉在甘肃省的唯一分布地

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）。1992–95调查估计有110只–刘乃发数据

● 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：35° 30'N 106° 50'E

海拔高度：1,300–2,200 米

保护状况：1982年建立太统–崆峒山省级自然保护区（面积1,089公顷），2005年升级为国家级自然保护区（16,283公顷）

地区描述：位于甘肃东部黄土高原，西部和北部与宁夏交界，泾河从中流过

对鸟类重要性简述：

● 本地于50年代还有大群大鸨于秋季过境，但自70年代以来已绝迹

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄爪隼（易危）

● 生物群系：AS04 欧亚大陆草原和沙漠

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

名称：合水（Heshui）

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：290,000公顷

座标：36° 00'N 108° 20'E

海拔高度：1,200-1,650 米

保护状况：未受到保护

地区描述：位于甘肃省东部，与陕西为邻。地处子午岭，人口较稠密。生境类型主要为温带高山阔叶落叶林、次生灌林、冻草原与农地等

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：玉带海雕（易危）
- 生物群系：AS04 欧亚大陆草原和沙漠

其它重要动植物简述：资料暂缺