


贵州省



雷公山（第288号重点鸟区），地无三里平的贵州，很多山林地带都是西南特有鸟类的栖身之所。（禹林摄影）



重点鸟区编号：CN273

名称：妥打白冠长尾雉自然保护区 (Tuoda Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：4,300公顷

座标：26° 59'N 104° 03'E

海拔高度：2,000–2,400米

保护状况：1992年建立县级自然保护区

地区描述：该保护区属高原地貌，地势平缓，森林植被属中亚热带常绿阔叶林。初步考察有维管束植物76科186属318种。原生植被已被破坏，次生植被发育良好。森林覆盖率在80%以上

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、鵙色鹀（易危）、巨鵰（易危）
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：保护区内有鸟类17目31科152种，兽类30余种，包括贵州疣螈、穿山甲、斑羚等。有国家一级保护植物红豆杉、南方红豆杉，国家二级保护植物厚朴、大叶樟等

重点鸟区编号：CN274

名称：草海自然保护区 (Cao Hai Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约12,000公顷

座标：26° 50'N 104° 15'E

海拔高度：2,020–2,854米

保护状况：1985年建立保护区，1992年升级为草海国家级自然保护区，面积12,000公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：草海位于贵州省威宁彝族回族苗族自治县县城西侧，是一个淡水湖，湖面海拔2,170米。草海是一个不规则的淡水湖，水面周围是沼泽和草甸，湖中满布水生植物

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：青头潜鸭（易危）、白肩雕（易危）、黑颈鹤（易危）
 - 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：斑头雁、赤麻鸭、赤膀鸭、赤颈鸭、黑颈鹤、白骨顶
- 其它重要动植物简述：威宁蛙*Rana weiningensis*为该地区特有种

重点鸟区编号：CN275

名称：冷水河自然保护区 (Lengshuihe Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：8,133公顷

座标：27° 30'N 106° 00'E

海拔高度：718–1,884米

保护状况：受到保护，为县级自然保护区

地区描述：主要生境为森林与灌丛

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN276

名称：赤水桫椤自然保护区 (Chishui Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：13,300公顷

座标：28° 28'N 105° 59'E

海拔高度：330–1,455米

保护状况：1984年建立县级自然保护区，1992年升级为赤水桫椤国家级自然保护区，面积3,200公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：赤水桫椤自然保护区位于贵州北西部的赤水县葫市镇。该区中亚热带常绿阔叶林发育良好，动物植物种类繁多，国家一级重点保护植物桫椤在保护区内分布较集中，在中国属于罕见。另外有珍稀植物小黄花茶，目前仅见于该地区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护兽类包括云豹、黑熊、藏酋猴、林麝、鬣羚及穿山甲等。国家级保护植物有桫椤、福建柏等

面积：约 10,000公顷

座标：28° 23'N 107° 02'E

海拔高度：800–1,250米

保护状况：未受到保护

地区描述：主要生境为森林与灌丛

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN282

名称：梵净山自然保护区 (Fanjing Shan Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：41,900公顷

座标：27° 55'N 108° 46'E

海拔高度：500–2,752米

保护状况：1978年建立保护区，1986年升级为梵净山国家级自然保护区，面积约41,900公顷，本重点鸟区与之重叠。在1986年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：梵净山自然保护区位于贵州省东北部铜仁地区的江口、印江、松桃三县交界处，东西宽21公里，南北长27公里，气候温暖湿润，亚热带常绿阔叶林发育和保存较好，是黔金丝猴等珍稀濒危物种的良好栖息地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、白冠长尾雉（易危）

- 特有鸟区：140中国亚热带林区、141中国东南部山区

- 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护兽类包括黔金丝猴、熊猴、云豹、华南虎、林麝及鬣羚等。国家级保护植物包括珙桐、连香树、香果树、鹅掌楸等

重点鸟区编号：CN279

名称：大沙河自然保护区 (Dashuhe Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：26,990公顷

座标：29° 07'N 107° 41'E

海拔高度：1,200–1,921米

保护状况：1984年设立。2001年升为省级保护区

地区描述：位于道真仡佬族苗族自治县。主要生境为森林与灌丛

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国亚热带林区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN280

名称：麻阳河自然保护区 (Mayanghe Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：31,113公顷

座标：28° 45'N 108° 13'E

海拔高度：280–1,441米

保护状况：1987年建立保护区，1994年升级为省级自然保护区，2003年升级为国家级自然保护区

地区描述：资料暂缺

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国亚热带林区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：是黑叶猴全球最大的分布地（有个体七百多只）

重点鸟区编号：CN283

名称：四野屯自然保护区 (Siyetun Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：2,859公顷

座标：27° 40'N 107° 58'E

海拔高度：资料暂缺

保护状况：受到保护，为县级自然保护区

地区描述：主要生境为森林与灌丛

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN284

名称：佛顶山林区 (Fodingshan Forest)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：17,170公顷

座标：27° 16'N 108° 05'E

重点鸟区编号：CN278

名称：青杠塘-太白-大河林区 (Qinggangtang—Taibai—Dahe Forest)

重点鸟区选录准则：A1 A3

名称：宽阔水自然保护区 (Kuankuoshui Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：26,231公顷

座标：28° 13'N 108° 08'E

海拔高度：650–1,750米

保护状况：1989年建立县级自然保护区，2001年升级为省级自然保护区，2007年升级为国家级自然保护区

地区描述：资料暂缺

海拔高度：580—1,869米

保护状况：部分受到保护

地区描述：舍石阡佛顶山自然保护区和施秉佛顶山自然保护区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国亚热带林区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN287

名称：平塘、贵定山间溪流（Mountain Streams in Pingtang and Guiding）

重点鸟区选录准则：A1

面积：约10,000公顷

座标：26° 34'N 107° 14'E

海拔高度：600—800米

保护状况：未受到保护

地区描述：山间溪流，详细资料暂缺

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：中华秋沙鸭（濒危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN285

名称：朱家山自然保护区（Zhujia Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：7,638公顷

座标：26° 57'N 107° 37'E

海拔高度：800—1,368米

保护状况：于1995年建立县级自然保护区

地区描述：地处黔南苗族布依族自治州瓮安县境内，属沅江上游舞阳河的河源地带。地势西高东低，主要河流有三条：长岭河、朱家河与拉岔河；区内有保存良好且水源涵养功能较强的中亚热带常绿阔叶林约2,500公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家重点保护动物有斑林狸、猕猴、穿山甲、林麝、水獭、小灵猫、大鲵等。据调查有种子植物750种，裸子植物9种，包括国家重点保护的银钟花、香果树、白辛树、银鹊树等

重点鸟区编号：CN286

名称：红枫湖、百花湖（Hongfeng Hu and Baihua Hu）

重点鸟区选录准则：A4i A4iii

面积：7,170公顷

座标：26° 35'N 106° 27'E

海拔高度：1,180—1,250米

保护状况：未受到保护

地区描述：红枫湖位于乌江支流猫跳河上游，坝址位于清镇市姬昌桥，面积57.2平方公里。百花湖处于猫跳河中游，坝址在贵阳市朱昌镇，面积14.5平方公里。两湖区已分别被列为国家级与省级风景名胜区。红枫湖的水禽多集中于北湖，百花湖的水禽则分布于人为干扰小的静水湾。由于地处贵阳市附近，该区面临污染问题，旅游开发也带来污染和干扰

对鸟类重要性简述：

- 1996年记录的越冬水鸟超过20,000只，以绿头鸭为主，其次有白骨顶、红嘴鸥、苍鹭、小白鹭等

- 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：绿头鸭（1996年连同其他水鸟，数量估计达20,000。）

其它重要动植物简述：资料暂缺

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN290

名称：青杠塘—太白—大河林区（Qinggangtang-Taibai-Dahe）

名称：茂兰自然保护区（Maolan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：约20,000公顷

座标：25° 15'N 107° 55'E

海拔高度：430—1,078米

保护状况：1985年建立保护区，1988年升级为茂兰国家级自然保护区，面积约20,000公顷，本重点鸟区与之重叠。在1996年列为联合国教科组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：茂兰自然保护区位于贵州南部荔波县黔桂交界处，其东、南面与广西环江县毗邻。东西宽22.8公里，南北长21.8公里。主要为纯质石灰岩及白云岩构成的喀斯特地貌，有亚热带地区特有的喀斯特森林，2万公顷的面积上森林覆盖率达90%以上

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：仙八色鸫（易危）、鹊色鹂（易危）、白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：140中国亚热带林区，141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护兽类包括豹、黑熊、斑林狸、林麝及鬣羚等。国家级保护植物包括南方铁杉、翠柏、广东五针松及掌叶木等

重点鸟区编号：CN288

名称：雷公山自然保护区（Leigong Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：47,300公顷

座标：26° 25'N 108° 15'E

海拔高度：650—2,179米

保护状况：1982年建立雷公山省级自然保护区，面积47,300公顷，本重点鸟区与之重叠。2001年升为国家级自然保护区

地区描述：雷公山位于贵州省东南部，是苗岭山地的主峰，地跨雷山、台江、剑河、榕江4个县，是长江水系与珠江水系的分水岭。海拔1,400米以下多被开垦为农耕地或为草坡灌丛，成片的水田、旱地随处可见。海拔1,400—1,850米之间的地带为常绿落叶阔叶混交林，海拔2,100米以上地带多为杜鹃灌丛和箭竹

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护兽类包括穿山甲、大灵猫、小灵猫、金猫、斑林狸、黑熊、林麝及鬣羚等。国家级保护植物包括秃杉、水青树、福建柏、鹅掌楸及钟萼木等

重点鸟区编号：CN289

名称：月亮山林区（Yueliangshan Forest）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：57,600公顷

座标：26° 05'N 108° 12'E

海拔高度：310—1,508米

保护状况：部分受到保护

地区描述：从江月亮山州级自然保护区和榕江月亮山州级自然保护区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：白颈长尾雉（近危）

- 特有鸟区：141中国亚热带林区