


# 吉林省



在北大岗（第038号重点鸟区）草原上的栗斑腹鹀，近年来可能因为生境变化，令这种国际性易危的鸟类数量大减。（刘阳摄影）



吉林重点鸟区分布图

大鸨（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤

其它重要动植物简述：有丰富的鱼类和小型兽类多样性

### 重点鸟区编号：CN043

名称：腰井子羊草草原保护区（Yaojingzi Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：23,800公顷

座标：44° 35'N 123° 30'E

海拔高度：120–140米

保护状况：1986年建立省级自然保护区，是针对保护羊草草原的保护区，对鸟类考虑较少

地区描述： 本区地处长岭、乾安和前郭尔罗斯三县交界处，西临通让铁路，北距大苏布湖不足10公里

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、大鸨（易危）、栗斑腹鸨（易危）

其它重要动植物简述：兽类包括狐、狼、野兔及鼠类等

### 重点鸟区编号：CN044

名称：松花江三湖自然保护区（松花湖、白山湖、红石湖）（Songhua Hu, Baishan Hu and Hongshi Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：1,144,710公顷

座标：42° 55'N 127° 15'E

海拔高度：190–1,400米

保护状况：1990年建立省级自然保护区，以1982年建立的原松花湖自然保护区为基础，加上上游新建的两水库连结而成

地区描述：本区是吉林省三湖自然保护区的一部分，该保护区是以原松花湖自然保护区为基础，包括新建的白山湖（水库）、红石湖（水库）和连结三湖间的松花江流域为主干形成的一个大型自然保护区，地跨吉林市、蛟河市、桦甸市、永吉县和靖宇县等3市2县。区内植被主要为寒带阔叶混交林、落叶阔叶林和天然次生林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、黄瓜隼（易危）

其它重要动植物简述：该区曾有东北虎、豹、猞猁、水獭、紫貂、黑熊、棕熊及梅花鹿等兽类，但近年数量稀少

### 重点鸟区编号：CN045

名称：大山嘴子（Dashanzuizi）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约120,000公顷

座标：43° 40'N 128° 40'E

海拔高度：340–800米

地区描述：本区位于大安市西南部，紧邻洮南市和通榆县交界处，范围包括位于洮南市东南角的邵家店泡，以及与通榆县为邻的牛心套堡泡、大岗泡、风水山牧场及其以北的草原和沼泽。该区人类干扰较少，是雁鸭类重要的繁殖和迁徙停歇站。虽然1993年在省林业厅批准下成立了以雁鸭为狩猎对象的狩猎场，但由于交通不便，很少有狩猎者前往

对鸟类重要性简述：

- 根据多次考察，估计迁徙期间该区水鸟数量在15万只以上

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）。鸿雁在1992年曾记录到超过500只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸿雁、豆雁（1992年记录到1,200只，约占东亚越冬种群7.9%）、灰雁（1992年记录到超过3,000只，约占东亚越冬种群61.1%）

其它重要动植物简述：区内有丰富的鱼类资源

### 重点鸟区编号：CN041

名称：查干湖自然保护区（Chagan Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：50,684公顷

座标：45° 15'N 124° 20'E

海拔高度：126–290米

保护状况：1986年建立省级自然保护区

地区描述：本区主要包括查干湖和附近的沼泽湿地，西面与乾安县为邻，西北角与大安市接壤，东距长山镇约5公里，北距大安市约30公里。查干湖是中国第十大淡水湖，亦是吉林省渔业和芦苇生产基地之一

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）

- 据估计每年有超过50,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：曾经有黄羊、狼、狐及黄鼬等分布，现在数量已很少

### 重点鸟区编号：CN042

名称：大布苏湖（Dabusu Hu）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：11,000公顷

座标：44° 48'N 123° 40'E

海拔高度：约120米

保护状况：1993年成立大布苏狼牙坝自然保护区，2004年升级为国家级自然保护区

地区描述：该区主要以大布苏湖为主体，包括湖四周的大片沼泽湿地和草地。北距大布苏镇约3公里，西北面紧邻通让铁路，东边是狼牙坝风景区

对鸟类重要性简述：

- 大布苏湖水鸟甚多，在迁徙期间曾记录到丹顶鹤、大鸨、鸿雁等。估计每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、

### 重点鸟区编号：CN036

名称：野马图（Yematu）

重点鸟区选录准则：A1

面积：约30,000公顷

座标：45° 40'N 122° 02'E

海拔高度：145–430米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于洮南市西部与内蒙古交界处的野马图和黑顶山一带，是大兴安岭东南麓南端，地貌特征为低山、山脚丘陵灌丛和干旱草原。该区处于鸟类迁徙路线上，迁徙季节有许多雀形目鸟类经过

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：栗斑腹鸨（易危）。该鸟种在此区繁殖

其它重要动植物简述：兽类包括狼、狐、兔等

### 重点鸟区编号：CN037

名称：向海国家级自然保护区（Xianghai Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：105,467公顷

座标：45° 05'N 122° 20'E

海拔高度：156–192米

保护状况：1981年建立省级自然保护区，1986年升级为国家级自然保护区。1992年加入“国际重要湿地”名录，2002年加入东北亚鹤类网络

地区描述：本区地处蒙古高原与东北平原相接处的松嫩平原西端，北接洮南，西邻内蒙古自治区科尔沁右旗中旗。区内地势低洼，湖泊泡沼密布，是水鸟重要的繁殖地和迁徙时的停歇站。保护区根据动植物分布划分了五块核心保护区，面积达28,000公顷。目前记录鸟类已达220种

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、虎头海雕（易危）、乌雕（易危）、黄瓜隼（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）、栗斑腹鸨（易危）。栗斑腹鸨在该区繁殖，数量占全球种群1%以上。至80年代青头潜鸭还被记载为“常见繁殖鸟”，但近十年间已无新纪录

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳（迁徙期间数量可超过100只）、青头潜鸭、白鹤（秋季最多可见近100只）、白头鹤、丹顶鹤（迁徙时数量达60只）

- 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：兽类包括刺猬、狼、狐、貉、黄鼬、狗獾及兔等

### 重点鸟区编号：CN038

名称：北大岗（Beidagang）

重点鸟区选录准则：A1

面积：48,600公顷

座标：45° 55'N 122° 55'E

海拔高度：200–250米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于镇赉西部北大岗机械林场内，西面和北面与内蒙古乌兰浩特市科尔沁右旗前旗为邻，东南西距镇赉县城最近距离约10公里左右。该区是大鸨及栗斑腹鸨的主要分布地之一
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：乌雕（易危）、大鸨（易危）、栗斑腹鸨（易危）。六十年代可见50–60只一群的大鸨，现在数量已明显减少

其它重要动植物简述：兽类包括黄羊、狼、狐及兔等，但近年除兔外其它皆少见

### 重点鸟区编号：CN039

名称：莫莫格自然保护区（Melmeg Nature Reserve 或 Momege Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约144,000公顷

座标：46° 00'N 123° 45'E

海拔高度：120–150米

保护状况：1981年建立省级自然保护区，1997年升级为国家级自然保护区

地区描述：该区位于吉林省西部白城市镇赉县境内，距镇赉县城最近距离约22公里，是嫩江下游和洮儿河沿岸以及两河交汇处由于地势低洼形成的一系列湖泊。全区沼泽面积达30,000公顷，草原20,000公顷，林地11,540公顷，农田11,200公顷。该区在迁徙期间鸟类数量达100,000只以上

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳、白鹤、丹顶鹤。迁徙期间白鹤及东方白鹳的数量分别可达425及800只，超过全球种群的1%（1989年资料）

- 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：兽类包括狼、狐及兔等

### 重点鸟区编号：CN040

名称：牛心套堡（Niuxintaobao）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：43,200公顷

座标：45° 24'N 123° 29'E

海拔高度：80–130米

保护状况：未受到保护

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于敦化市东部大山嘴子、林胜、官地、黑石等4乡境内，距敦化市最近距离约20公里。除了自然湖泊之外，还有大中型水库5个，是水鸟的繁殖地及迁徙期间的重要驿站

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、毛腿渔鸮（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、鸿雁（濒危）、青头潜鸭（易危）、大鸨（易危）。中华秋沙鸭在1983年曾记录到约30只个体。鸿雁在1983年记录到约100只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：中华秋沙鸭

- 在本区的湖泊水库迁徙栖息的水鸟估计数量在100000只以上

其它重要动植物简述：该区曾有东北虎、豹、猞猁、紫貂、水獭、黑熊、棕熊、黄鼬、梅花鹿、马鹿及麝等珍稀兽类，但近年数量稀少

### 重点鸟区编号：CN046

名称：白河-万宝（Baihe-Wanbao）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i A4iii

面积：约120,000公顷

座标：42° 40'N 128° 05'E

海拔高度：600-700米

保护状况：本区包括112公顷的白河保护区

地区描述：本区从二道白河镇往北到万宝镇，为一丘陵地带。区内有河流十多条，并有水库与湖泊，其间散布有大量沼泽湿地和农田，水域资源丰富。沿山脊与河谷有半岛状或呈岛状分布的次生林和针阔叶混交林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：中华秋沙鸭（濒危）、青头潜鸭（易危）

- 在河流与新建的水库内，每年迁徙季节都有大量野鸭等水禽聚集，估计数量在20,000只以上

- 生物群系：AS02寒带森林（泰加林）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸳鸯。经常见到50-60只的群体，估计总数量在500左右，超过东亚种群数量的1%

其它重要动植物简述：兽类包括水獭、东北虎、豹、猞猁及黑熊等

### 重点鸟区编号：CN047

名称：敬信-防川段图们江（Tumen River at Jingxin-Fangchuan）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：8000公顷

座标：42° 35'N 130° 32'E

海拔高度：5-695米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于吉林省东部琿春市敬信乡境内，长白山北坡图们江下游中、俄、朝三国交界处。范围包括敬信五大泡子、圈河、防川及敬信至防川的图们江流域及沿岸沼泽湿地。区内湖泊

密布，江面多沙洲、小岛，沿岸多沼泽湿地，是水鸟的适宜栖息环境，估计每年迁徙季节水鸟数量在20,000只以上

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、虎头海雕（易危）、栗斑腹鸱（易危）。丹顶鹤在1983年曾记录到超过30只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：多种鸭类、丹顶鹤。绿头鸭、绿翅鸭等鸭类据估计迁徙时数量在20,000只以上

其它重要动植物简述：偶有斑海豹的记录

### 重点鸟区编号：CN048

名称：长白山国家级自然保护区（Changbai Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i

面积：196,465公顷

座标：42° 03'N 128° 00'E

海拔高度：780-2690米

保护状况：1960年建立省级自然保护区，1986年升级为国家级自然保护区。1980年被联合国教科文组织列入“人与生物圈保护区网络”

地区描述：位于吉林省东南部，安图、抚松、长白三县交界处。东南与朝鲜毗邻，是长白山原始森林的核心地区。植被呈明显的垂直分布，由温带针阔叶混交林到寒温带针叶林和山顶苔原

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、黄爪隼（易危）。中华秋沙鸭在1990-1992年繁殖种群约40-50对，是中国最大的繁殖种群

- 生物群系：AS02寒带森林（泰加林）、AS03东北亚温带森林

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：中华秋沙鸭

其它重要动植物简述：兽类包括东北虎、紫貂、梅花鹿、水獭、猞猁、斑羚及麝等，也是极北鲑的分布地



长白山（第048号重点鸟区）是中国最早建立的保护区之一，保存了东北森林的面貌。（陈彬摄影）

### 重点鸟区编号：CN049

名称：云峰水库（Yunfeng Reservoir）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：约10,000公顷

座标：41° 30'N 126° 35'E

海拔高度：约400米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于鸭绿江中游，上至临江市的苇沙河镇，往下经白山市到集安市的下解放，直线距离约60公里。江面宽阔，迁徙期间有大量水禽聚集

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、青头潜鸭（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺