


# 陕西省



洋县的朱鹮分布地（第300号重点鸟区），世界上唯一的野生朱鹮群体，从1981年的7只经悉心保护后增加到几百只，令朱鹮逃离了绝种的厄运。（丁长青摄影）



## 重点鸟区编号：CN291

名称：红碱淖（Hongjian Nur）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：21,700公顷

座标：39° 05'N 109° 55'E

海拔高度：资料暂缺

保护状况：1996年建立红碱淖自然保护区

地区描述：位于神木县西北部尔林兔乡，为当地众多荒漠湖泊中最大的一个。地方偏远荒凉，人烟稀少，有大量水禽在此越冬或繁殖

对鸟类重要性简述：

- 自2005年起，有大群遗鸥在此繁殖，很可能是从鄂尔多斯的繁殖地过来的繁殖群。历史上有过卷羽鹈鹕（易危）、大鸨（易危）分布，近况不详

- 区内分布的国际性受胁鸟类：遗鸥（易危）

- 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：大天鹅、普通秋沙鸭、灰鹤、遗鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN292

名称：黄龙山褐马鸡自然保护区（Huanglong Shan Eared-pheasant Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：60,439公顷

座标：35° 40'N 110° 06'E

海拔高度：800-1,700米

保护状况：于1998年建立保护区

地区描述：位于延安市东南部，与陕北黄土高原相交。植被主要是温带高山阔叶针叶混生林和灌林。1998年3月在黄龙山腹地发现褐马鸡，但尚无详细调查

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：褐马鸡（易危）

- 特有鸟区：136晋冀山区

- 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN293

名称：合阳黄河湿地自然保护区（Heyang Huang He Wetlands Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：57,348公顷

座标：35° 09'N 110° 20'E

海拔高度：约380米

保护状况：1996年设立保护区，现为省级保护区

地区描述：位于陕西省合阳，韩城，大荔县境内的黄河滩涂及河心滩，南北长约40公里。黄河河道在此明显变宽，流速减慢，大

量泥沙沉积，造成黄河两岸及河道中央出现大面积芦苇荡和浅滩，为水禽越冬提供了较好的场所

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、白肩雕（易危）、大鸨（易危）。在1995据报发现丹顶鹤百只以上，但还未能消息是否准确。大鸨于1995年3月记录到25只

- 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：大白鹭（1999年1月记录到约300只）、大天鹅（1999年1月记录到约500只）、普通秋沙鸭（1999年1月记录到约300只）、灰鹤（1995年3月记录到300只的大群，1999年1月记录到约80只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN294

名称：渭南三河湿地（Weinan Sanhe Wetlands）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：39,375公顷

座标：34° 58'N 110° 16'E

海拔高度：330-378米

保护状况：1995年建立保护区

地区描述：为黄河、渭河、洛河三河交汇地段。受三门峡水库回水影响，泥沙淤积，河床抬高，形成河心滩、河漫滩、沼泽、草甸和盐碱地。大量水禽在此越冬

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、花脸鸭（易危）、大鸨（易危）。丹顶鹤据报1995年2月有40多只，但该数据需进一步核实。花脸鸭于1980年有记录，但近况不明。大鸨于1997年记录到30多只

- 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：灰鹤（2000年1月观察到111只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN295

名称：二郎坝（Erlangba）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：1,600公顷

座标：33° 49'N 107° 31'E

海拔高度：1,000-2,700米

保护状况：未正式受到保护，但计划在2010年建成太白县黄柏源自然保护区（面积37,000公顷）

地区描述：位于秦岭山脉腹地，生境主要是温带高山针阔混交林和针叶林（面积约占60%），杂有灌林和农地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）。据1984年统计估计数量高达138只，1995年在该区依然有分布

- 生物群系：AS05 欧亚大陆高山区、AS07 中国-喜马拉雅温带森林

其它重要动植物简述：主要的保护对象是大熊猫、羚牛、大鲵等

**重点鸟区编号：CN296**

名称：周至金丝猴自然保护区（Zhouzhi Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：56,393公顷

座标：33° 46'N 108° 03'E

海拔高度：980–2,996米

保护状况：1988年成立保护区，本重点鸟区位于保护区内。现为国家级自然保护区

地区描述：位于秦岭中段北坡的林区，包括厚畛子、安家岐、小王涧和板房子四个保护站。因在黑河上游，故为西安市重要水源涵养地。被108国道分成东西两部分

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）。20世纪70年代以前在板房子保护站铁厂沟有分布，近年无报道
- 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：珍稀植物有太白红杉、水青树、连香树、山白树等；重点保护动物有大熊猫、金丝猴、牛羚等

**重点鸟区编号：CN297**

名称：太白山自然保护区（Taibai Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：56,235公顷

座标：33° 57'N 107° 40'E

海拔高度：720–3,700米

保护状况：保护区建于1965年，1986年升为国家级保护区。本重点鸟区与之重叠

地区描述：位于秦岭山脉中段，是个旅游胜地，也是中国首批建立的自然保护区之一

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：棕头歌鸲（易危）、黑喉歌鸲（易危）
  - 特有鸟区：137川中山区
  - 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：有珍稀植物21种，如狭叶瓶尔小草、水青树、天麻、野大豆等

**重点鸟区编号：CN298**

名称：佛坪自然保护（Foping Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：29,240公顷

座标：33° 38'N 107° 47'E

海拔高度：900–2,800米


保护状况：于1979年建立保护区，1986年升为国家级自然保护区

2004年被列为“人与生物圈”的生物圈自然保护区

地区描述：位于秦岭南坡，包括岳坝、大古坪、三官庙、龙潭子四个保护站和保护区外围的栗子坝、狮子坝和石砚沟。主要生境类型为温带高山阔叶落叶林、阔叶针叶混生林、常绿林和灌木，农地面积不超过10%

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
  - 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：重点保护动物包括大熊猫、羚牛等



佛坪自然保护区（第298号重点鸟区），在秦岭山系的大熊猫保护区，也保存了温带森林生境。（陈亮摄影）

**重点鸟区编号：CN299**

名称：长青自然保护区（Changqing Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：29,906公顷

座标：33° 30'N 107° 38'E

海拔高度：800–3,071米

保护状况：1995年建立国家级自然保护区

地区描述：地处秦岭中段南坡洋县华阳镇，以前是长青林业局，于1994年立保护区。区内保存有原始林、次生林和采伐迹地。森林破坏严重，但仍具有可观的物种多样性。本区以保护大熊猫及其生境为主，1997年开始开展保护区管理规划的GEF项目

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
- 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：有兽类51种，包括大熊猫、羚牛、金丝猴等。有重点受保护植物31种，包括太白红杉、秦岭冷杉等

**重点鸟区编号：CN300**

名称：洋县周边地带（Yang Xian and Neighbouring Areas）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i

面积：约70,000公顷

座标：33° 15'N 107° 25'E

海拔高度：450–1,190米

保护状况：受到保护。洋县朱鹮保护观察站于1988年成立（前身为1981年成立的朱鹮保护小组和县级保护站），保护管理范围包括整个朱鹮活动区，无固定边界

地区描述：包括朱鹮在洋县的繁殖区、草坝夜宿地和游荡区：繁殖区（面积约28,000公顷）位于洋县西北部的中低山地区，包括铁河乡、窑坪乡、阳平乡和花园乡的共16个巢区。朱鹮每年冬末（1月）到此配对营巢育雏，夏季（6月）离开此地前往游荡区；草坝夜宿地（面积14公顷）离洋县朱鹮饲养场不足一公里，是唯一全年有朱鹮活动的夜宿地，秋季最大群可达51只。朱鹮饲养场经常吸引野生朱鹮到场地附近，这可能也是常年有野生朱鹮在草坝夜宿的一个原因。1996年与1997年有一对朱鹮在草坝繁殖，分别产出幼鸟3只和2只；

游荡活动区（面积约40,000公顷）东西25公里，南北20公里，包括汉江河滩、溢水河口、党河河口、高家河水库、贮溪河水库、谢村、贯溪、四郎等。区内人类活动与农业生产较多。朱鹮每年夏秋季在此活动，冬春季时亚成体仍停留在此地

对鸟类重要性简述：

- 差不多是世界所有野生朱鹮个体的分布区
  - 区内分布的国际性受胁鸟类：朱鹮（濒危）、白冠长尾雉（易危）
  - 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
  - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：朱鹮
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

**重点鸟区编号：CN301**

名称：二岭沟鹭鸟繁殖地（Erlinggou）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i

面积：440公顷

座标：33° 05'N 107° 21'E

海拔高度：580米

保护状况：未受到保护

地区描述：在大巴山西段，米仓山北麓。鹭鸟繁殖地在山沟之中，70%植被为针阔混交林，人迹罕至

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）。在1990年有记录
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 区内分布数量超过东亚或中亚-南亚种群1%的鸟类：小白鹭、夜鹭

其它重要动植物简述：资料暂缺

**重点鸟区编号：CN302**

名称：牛背梁自然保护区（Niubeiliang Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：16,418公顷

座标：33° 50'N 108° 54'E

海拔高度：1,300–2,802米

保护状况：1987年成立保护区，1988年升级为国家级自然保护区。海拔1,800米以上为核心区，面积7,239公顷

地区描述：位于秦岭东段，地跨长安、柞水和宁陕三县，以羚牛为主要保护对象。区内约八成是温带高山阔叶混生林。此地为西安市的重要水源涵养地，距秦岭保护区群60公里，被210国道分为两部分

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
  - 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：计有重点保护动物25种，如豹、金猫、青鼬、黑熊、羚牛、鬃羚、斑羚、林麝、大鲵等。有重点保护植物11种，如太白红杉、连香树、华榛、金钱槭等

**重点鸟区编号：CN303**

名称：化龙山自然保护区（Hualong Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：28,103公顷

座标：32° 02'N 109° 22'E

海拔高度：800–2,917米

保护状况：保护区于2000年建立省级自然保护区

地区描述：地处陕西、湖北、四川三省交界处，属巴山山脉，气候植被等呈现亚热带的特征。森林覆盖达80%以上

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
  - 生物群系：AS07 中国-喜马拉雅温带森林、AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：资料暂缺